Vorlesung über Modelltheorie[1]

Martin Ziegler

Freiburg
Wintersemester 1997/98

[1] Version 6.1 (7.2.2000)

Inhaltsverzeichnis

1 Grundbegriffe **3**

1 Strukturen 3

2 Formeln 8

3 Theorien 16

2 Elementare Unterstrukturen und der Kompaktheitssatz **19**

4 Elementare Unterstrukturen 19

5 Der Kompaktheitssatz 22

6 Der Satz von Löwenheim–Skolem 27

3 Quantorenelimination **29**

7 Erhaltungssätze 29

8 Quantorenelimination 34

9 Beispiele 37

4 Abzählbare Modelle **43**

10 Der Omitting Types Satz 43

11 $\aleph_0$–kategorische Theorien 46

12 Primmodelle 53

5 $\aleph_1$–kategorische Theorien **56**

13 Indiscernibles 56

14 ω–stabile Theorien 59

15 Vaughtsche Paare 63

16 Morley abwärts 66

6 Die Baldwin–Lachlan Theorie **68**

17 Streng minimale Theorien 68

18 Der Satz von Baldwin–Lachlan 74

A Mengenlehre **77**

1 Kardinalzahlen 77

2 Ordinalzahlen 80

B Körpertheorie **82**

3 Ringe und Körper 82

4 Algebraisch abgeschlossene Körper 85

5 Reell abgeschlossene Körper 87

Literaturverzeichnis **89**

Index **90**

C Changes **95**

Kapitel 1

Grundbegriffe

1 Strukturen

Definition Eine Sprache L ist eine Menge von Konstanten, Funktionszeichen und Relationszeichen[1].

Funktionszeichen und Relationszeichen haben eine Stelligkeit ≥ 1. Man kann Konstanten auch als 0–stellige Funktionszeichen auffassen. In vielen Diskussionen wird der Fall der Konstanten übergangen, wenn der Fall der Funktionszeichen sich auf den 0–stelligen überträgt.

Eine Liste von Beispielen:

$\mathrm{L}_\emptyset = \emptyset$	Die leere Sprache
$\mathrm{L}_{\mathrm{AG}} = \{\underline{0}, +, -\}$	Die abelsche Gruppen–Sprache.
$\mathrm{L}_{\mathrm{R}} = \mathrm{L}_{\mathrm{AG}} \cup \{\underline{1}, \cdot\}$	Die Ring–Sprache.
$\mathrm{L}_{\mathrm{G}} = \{\underline{e}, \circ, ^{-1}\}$	Die Gruppen–Sprache.
$\mathrm{L}_{\mathrm{O}} = \{<\}$	Die Ordnungs–Sprache.
$\mathrm{L}_{\mathrm{AR}} = \mathrm{L}_{\mathrm{R}} \cup \mathrm{L}_{\mathrm{O}}$	Die angeordneter Ring–Sprache.
$\mathrm{L}_{\mathrm{N}} = \{\underline{0}, \mathrm{S}, +, \cdot, <\}$	Die Sprache der natürlichen Zahlen.
$\mathrm{L}_{\mathrm{Me}} = \{\epsilon\}$	Die Mengenlehre-Sprache.

Dabei sind

Konstanten:	$\underline{0}$, $\underline{1}$, $\underline{e}$
einstellige Funktionszeichen:	$-$, $^{-1}$, S
zweistellige Funktionszeichen:	$+$, $\cdot$, $\circ$
zweistellige Relationszeichen:	$<$, ϵ.

Definition Sei L eine Sprache. Eine L–Struktur ist ein Paar $\mathfrak{A} = \big(A, (Z^{\mathfrak{A}})_{Z \in L}\big)$, wobei

[1] Wir verwenden *Relationszeichen* und *Prädikat* synonym.

A	eine nicht–leere Menge (die *Grundmenge*[2] von $\mathfrak{A}$) ist,
$Z^{\mathfrak{A}} \in A^n$,	wenn Z eine Konstante ist,
$Z^{\mathfrak{A}} : A^n \longrightarrow A$,	wenn Z ein n–stelliges Funktionszeichen ist, und
$Z^{\mathfrak{A}} \subset A^n$,	wenn Z ein n–stelliges Relationszeichen ist.

Die Mächtigkeit (oder Kardinalität) von $\mathfrak{A}$ ist die Mächtigkeit von A. Wir schreiben dafür $|\mathfrak{A}|$.

Definition $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ seien L–Strukturen. Eine Abbildung $h : A \to B$ heißt Homomorphismus, wenn für alle $a_1, \ldots, a_n \in A$

$$\begin{aligned} h(c^{\mathfrak{A}}) &= c^{\mathfrak{B}} \\ h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \ldots, a_n)) &= f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \ldots, h(a_n)) \\ R^{\mathfrak{A}}(a_1, \ldots, a_n) &\Rightarrow R^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \ldots, h(a_n)) \end{aligned}$$

für alle Konstanten c, n-stelligen Funktionszeichen f und Relationszeichen R aus L. Wir schreiben dafür

$$h : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}.$$

Wenn h injektiv ist und immer

$$R^{\mathfrak{A}}(a_1, \ldots, a_n) \Leftrightarrow R^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \ldots, h(a_n))$$

ist h eine (isomorphe) *Einbettung*. Ein *Isomorphismus* ist eine surjektive isomorphe Einbettung. Man notiert Isomorphismen als

$$h : \mathfrak{A} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{B}.$$

Wenn es einen Isomorphismus zwischen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ gibt, heißen sie isomorph. In Zeichen

$$\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}.$$

Man sieht leicht, daß Isomorphie ist eine Äquivalenzrelation ist.

Lemma 1.1 *Sei $\mathfrak{A}$ eine L–Struktur und $h : A \to B$ eine Bijektion. Dann läßt sich B auf genau eine Weise zu einer L–Struktur $\mathfrak{B}$ machen, sodaß h ein Isomorphismus*

$$h : \mathfrak{A} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{B}$$

wird.

Beweis:
Man definiert $(Z^{\mathfrak{B}})$ durch

$$\begin{aligned} c^{\mathfrak{B}} &= h(c^{\mathfrak{A}}) \\ f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \ldots, h(a_n)) &= h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \ldots, a_n)) \\ R^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \ldots, h(a_n)) &\Leftrightarrow R^{\mathfrak{A}}(a_1, \ldots, a_n) \end{aligned}$$

□

[2] Wir nennen A auch *Universum*. Die Forderung, daß A nicht leer sein soll, ist eine reine (und gelegentlich lästige) Konvention.

Definition $\mathfrak{A}$ heißt Unterstruktur von $\mathfrak{B}$, wenn $A \subset B$ und die Inklusionsabbildung eine isomorphe Einbettung von $\mathfrak{A}$ nach $\mathfrak{B}$ ist. Schreibweise:

$$\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}.$$

Manchmal schreibt man $\mathfrak{B} \restriction A$ für $\mathfrak{A}$.

Lemma 1.2 *Sei $\mathfrak{B}$ eine L–Struktur und A eine nicht–leere Teilmenge von B. A ist genau dann Universum einer (eindeutig bestimmten) Unterstruktur $\mathfrak{A}$, wenn A alle $c^{\mathfrak{B}}$ enthält und unter allen Operationen $f^{\mathfrak{B}}$ abgeschlossen ist.*

Beweis:

Klar. □
Manchmal sagt man dann einfach: *A ist Unterstruktur* von $\mathfrak{B}$.

Folgerung 1.3 *Wenn $h : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$, ist $h(A)$ Universum einer Unterstruktur von $\mathfrak{B}$.*

Beweis:

Man rechnet leicht nach, daß $h(A)$ die Bedingung von 1.2 erfüllt. □

Lemma 1.4 *Wenn alle $\mathfrak{A}_i$ Unterstrukturen von $\mathfrak{B}$ sind, ist der Durchschnitt der A_i leer oder eine Unterstruktur von $\mathfrak{B}$.*

Beweis:

Klar mit 1.2. □

Folgerung 1.5 *Sei S eine nicht–leere Teilmenge von $\mathfrak{B}$. Dann gibt es eine kleinste Unterstruktur $\mathfrak{A} = \langle S \rangle^{\mathfrak{B}}$, die S enthält.*

Beweis:

Für A nimmt man den Durchschnitt aller Unterstrukturen von $\mathfrak{B}$, die S enthalten. Dieser Durchschnitt ist nicht leer, weil er S enthält. □
Wir nennen $\mathfrak{A}$ das Erzeugnis von S.

Wenn L eine Konstante enthält, ist der Durchschnitt aller Unterstrukturen von $\mathfrak{B}$ nicht leer, weil er die $\mathfrak{B}$–Interpretation dieser Konstanten enthält. $\mathfrak{B}$ hat also eine kleinste Unterstruktur $\langle \emptyset \rangle^{\mathfrak{B}}$.

Lemma 1.6 *Wenn $\mathfrak{A}$ von S erzeugt wird, wird ein Homomorphismus $h : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ durch seine Werte auf S bestimmt.*

Beweis:

Wenn $h' : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ ein anderer Homomorphismus ist, ist $C = \{b \mid h(b) = h'(b)\}$ eine Unterstruktur. Wenn h und h' auf S übereinstimmen, ist S Teilmenge von C, und also $C = A$. □

Lemma 1.7 *Sei $h : \mathfrak{A} \to \mathfrak{A}'$ ein Isomorphismus und $\mathfrak{B}$ eine Oberstruktur von $\mathfrak{A}$. Dann gibt es eine Oberstruktur $\mathfrak{B}'$ von $\mathfrak{A}'$ und eine Fortsetzung $g : \mathfrak{B} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{B}'$ von f.*

Beweis:

Man setzt zuerst die Bijektion $h : A \to A'$ zu einer Bijektion $g : B \to B'$ fort und wendet dann 1.1 an. □

Definition Sei $(I, \leq)$ eine gerichtete partielle Ordnung[3]. Eine Familie $(\mathfrak{A}_i)_{i \in I}$ von L–Strukturen heißt gerichtet, wenn

$$i \leq j \Rightarrow \mathfrak{A}_i \subset \mathfrak{A}_j.$$

Wenn I linear geordnet ist, nennt man $(\mathfrak{A}_i)_{i \in I}$ eine Kette. Wenn zum Beispiel eine Struktur $\mathfrak{A}_1$ isomorph zu einer Unterstruktur $\mathfrak{A}_0 \subset \mathfrak{A}_1$ ist,

$$h_0 : \mathfrak{A}_0 \xrightarrow{\sim} \mathfrak{A}_1,$$

liefert 1.7 eine Erweiterung

$$h_1 : \mathfrak{A}_1 \xrightarrow{\sim} \mathfrak{A}_2.$$

Wenn wir so fortfahren, ergibt sich eine Kette $\mathfrak{A}_0 \subset \mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \ldots$ und eine aufsteigend Folge $h_i : \mathfrak{A}_i \xrightarrow{\sim} \mathfrak{A}_{i+1}$ von Isomorphismen.

Lemma 1.8 *Sei $(\mathfrak{A}_i)_{i \in I}$ eine gerichtete Familie von L–Strukturen. Dann ist $A = \bigcup_{i \in I} A_i$ Universum einer (eindeutig bestimmten) Struktur*

$$\mathfrak{A} = \bigcup_{i \in I} \mathfrak{A}_i,$$

die Oberstruktur aller $\mathfrak{A}_i$ ist.

Beweis:

Sei R ein n–stelliges Relationszeichen und $a_1, \ldots, a_n \in A$. Weil I gerichtet ist, gibt es einen Index k, sodaß alle a_i in A_k liegen. Man definiert (und das ist die einzige Möglichkeit)

$$R^{\mathfrak{A}}(a_1, \ldots, a_n) \Leftrightarrow R^{\mathfrak{A}_k}(a_1, \ldots, a_n).$$

Ähnlich verfährt man mit Konstanten und Funktionszeichen. □

Eine Teilmenge K von L nennen wir eine Teilsprache. Eine L–Struktur wird eine K–Struktur, wenn wir die Interpretation der Zeichen aus $L \setminus K$ vergessen:

$$\mathfrak{A} \restriction K = \left(A, (Z^{\mathfrak{A}})_{Z \in L}\right)$$

Wir nennen diesen Prozess *Restriktion*. Umgekehrt heißt $\mathfrak{A}$ *Expansion* von $\mathfrak{A} \restriction K$. Dafür einige Beispiele:

Wir halten ein L–Struktur $\mathfrak{A}$ fest.

[3] Das bedeutet, daß es für alle $i, j \in I$ ein $k \in I$ gibt mit $i \geq k$ und $j \geq k$.

a) Wenn R eine n–stellige Relation auf A ist, führen wir ein neues Relationszeichen $\underline{\mathrm{R}}$ ein und bezeichnen mit

$$(\mathfrak{A}, R)$$

die Expansion von $\mathfrak{A}$ zu einer $L \cup \{\underline{\mathrm{R}}\}$–Struktur, in der $\underline{\mathrm{R}}$ durch R interpretiert wird.

b) Für Elemente $a_1, \ldots, a_n$ können wir neue Konstanten $\underline{\mathrm{a}}_1, \ldots, \underline{\mathrm{a}}_n$ einführen und die $L \cup \{\underline{\mathrm{a}}_1, \ldots, \underline{\mathrm{a}}_n\}$–Struktur

$$(\mathfrak{A}, a_1, \ldots, a_n)$$

einführen.

c) Sei B eine Teilmenge von A. Wir fassen jedes Element von B als neue Konstante aus, das ergibt die Sprache

$$L(B) = L \cup B^4$$

und die $L(B)$–Struktur

$$\mathfrak{A}_B = (\mathfrak{A}, b)_{b \in B}\,.$$

[4] Wenn C eine Mengen von Konstanten ist, schreiben wir häufig $L(C)$ für $L \cup C$.

2 Formeln

L–Terme sind Zeichenfolgen, die aus den Konstanten, den Funktionszeichen von L und den Variablen

$$v_0, v_1, \ldots$$

nach den folgenden Regeln gebildet sind.

Definition

Jede Variable v_i ist ein L–Term.

Jede Konstante c ist ein L–Term.

Wenn f ein n–stelliges Funktionszeichen ist und wenn $t_1, \ldots, t_n$ L–Terme sind, dann ist auch $ft_1 \ldots t_n$ ein L–Term.

Um Terme besser lesbar zu machen, schreiben wir häufig $f(t_1, \ldots, t_n)$ statt $ft_1 \ldots t_n$. Wenn f einstellig ist, auch $t_1 f$, wenn f zweistellig ist, auch $t_1 f t_2$. Zum Beispiel steht $(x + y) \cdot (z + w)$ für $\cdot + xy + zw$ und$(x \circ y)^{-1}$ für $^{-1} \circ xy$.

Sei $\mathfrak{A}$ eine L–Struktur und $\vec{b} = (b_0, b_1, \ldots)$ eine Folge von Elementen, die wir als Belegung der Variablen $v_0, v_1, \ldots$ auffassen. Wenn wir im Term t, die Variable v_i durch die a_i ersetzen, berechnet t in naheliegender Weise ein Element $t^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]$ von $\mathfrak{A}$:

Definition Für L–Terme t, L–Strukturen $\mathfrak{A}$ und Belegungen $\vec{b}$ definieren wir $t^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]$ durch

$$\begin{aligned} v_i^{\mathfrak{A}}[\vec{b}] &= b_i \\ c^{\mathfrak{A}}[\vec{b}] &= c^{\mathfrak{A}} \\ ft_1 \ldots t_n^{\mathfrak{A}}[\vec{b}] &= f^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}[\vec{b}], \ldots, t_n^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]) \end{aligned}$$

Diese (rekursive) Definition ist nur möglich, weil Terme *eindeutig lesbar* sind: Wenn $ft_1 \ldots t_n = ft'_1 \ldots t'_n$, ist $t_1 = t'_1, \ldots, t_n = t'_n$. Der Beweis ist nicht schwer.

Lemma 2.1 *$t^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]$ hängt von b_i nur ab, wenn v_i in t vorkommt.*

Beweis:

Klar. □

Wenn die Variablen $x_1, \ldots, x_n$ paarweise verschieden sind[5] und keine anderen Variablen in t vorkommen, schreiben wir

$$t = t(x_1, \ldots, x_n).$$

Sei $\vec{b}$ eine Variablenbelegung die x_i mit a_i belegt. Dann ist

$$t^{\mathfrak{A}}[a_1, \ldots, a_n]$$

[5] beachte $x_i \in \{v_0, v_1, \ldots\}$

durch $t^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]$ nach dem letzten Lemma eindeutig definiert. Wenn $t_1, \ldots, t_n$ Terme sind, bezeichnen wir mit

$$t(t_1, \ldots, t_n)$$

den Term, der aus t entsteht, wenn wir $x_1, \ldots, x_n$ durch $t_1, \ldots, t_n$ ersetzen (Substitution). Man zeigt leicht, daß

Lemma 2.2 (Substitutionslemma)

$$t(t_1, \ldots, t_n)^{\mathfrak{A}}[\vec{b}] = t^{\mathfrak{A}}\left[t_1^{\mathfrak{A}}[\vec{b}], \ldots, t_n^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]\right]$$

□

Expandiert man $\mathfrak{A}$ zu einer $L(A)$–Struktur $\mathfrak{A}_A$ (vgl. S.7), so hat man den Spezialfall

$$t(a_1, \ldots, a_n)^{\mathfrak{A}_A} = t^{\mathfrak{A}}[a_1, \ldots, a_n].$$

Lemma 2.3 *$h : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ sei ein Homomorphismus und $t(x_1, \ldots, x_n)$ ein Term. Dann ist für alle $a_1, \ldots, a_n$ aus A*

$$t^{\mathfrak{B}}[h(a_1), \ldots, h(a_n)] = h\left(t^{\mathfrak{A}}[a_1, \ldots, a_n]\right)$$

Beweis:

Induktion über den Aufbau von t. □

Lemma 2.4 *S sei eine nicht–leere Teilmenge der L–Struktur $\mathfrak{A}$. Dann ist*

$$\langle S\rangle^{\mathfrak{A}} = \left\{t^{\mathfrak{A}}[s_1, \ldots, s_n] \mid t(x_1, \ldots, x_n)\ L\text{–Term},\ s_1, \ldots, s_n \in S\right\}$$

Beweis:

Aus 2.3 folgt, daß das Universum einer Unterstruktur unter $t^{\mathfrak{A}}[-, \ldots, -]$ abgeschlossen ist. Daraus folgt, daß die rechte Seite in $\langle S\rangle^{\mathfrak{A}}$ enthalten ist. Für die Umkehrung zeigt man, daß die rechte Seite unter den Operationen $f^{\mathfrak{A}}$ abgeschlossen ist. Daraus folgt die Behauptung mit 1.2. □

Ein konstanter Term ist ein Term ohne Variable. Wenn L mindestens eine Konstante enthält, hat man

$$\langle\emptyset\rangle^{\mathfrak{A}} = \left\{t^{\mathfrak{A}} \mid t \text{ konstanter } L\text{–Term}\right\}.$$

Aus dem letzten Lemma ergibt sich:

Folgerung

$$|\langle S\rangle| \leq \max\{\aleph_0, |L|, |S|\}$$

Beweis:

Es gibt höchstens $\max\{\aleph_0, |L|\}$ viele L–Terme und für jeden Term höchsten $\max\{\aleph_0, |S|\}$ viele Einsetzungen aus S. □

L–Formeln sind Zeichenreihen, die aus den Zeichen aus L, den Klammern (und) als Hilfszeichen und den folgenden *logischen* Zeichen gebildet sind:

Variablen	$v_0, v_1, \ldots$
Gleichheitszeichen	$\doteq$
Junktoren (Negationszeichen und Konjunktion)	$\neg, \wedge$
Existenzquantor	$\exists$

Definition L–Formeln sind

$t_1 \doteq t_2$	, wenn t_1, t_2 L–Terme sind,
$Rt_1 \ldots, t_n$	, wenn R ein n–stelliges Relationszeichen aus L und $t_1, \ldots, t_n$ L–Terme sind,
$\neg\psi$	, wenn ψ eine L–Formel ist,
$(\psi_1 \wedge \psi_2)$	,wenn ψ_1 und ψ_2 L–Formeln sind,
$\exists x\, \psi$	,wenn ψ eine L–Formel und x eine Variable ist.

Formeln der Form $t_1 \doteq t_2$ oder $Rt_1 \ldots, t_n$ heißen atomar oder Primformeln.

Wir verwenden folgende Abkürzungen:

$$\begin{aligned}
(\psi_1 \vee \psi_2) &= \neg(\neg\psi_1 \wedge \neg\psi_2) \\
(\psi_1 \to \psi_2) &= \neg(\psi_1 \wedge \neg\psi_2) \\
(\psi_1 \leftrightarrow \psi_2) &= ((\psi_1 \to \psi_2) \wedge (\psi_2 \to \psi_1)) \\
\forall x\, \psi &= \neg\exists x \neg\psi
\end{aligned}$$

für die Disjunktion, die Implikation, die Äquivalenz und den Allquantor.

Statt Rt_1t_2 schreiben wir auch t_1Rt_2 und statt $\exists x_1 \ldots \exists x_n$ schreiben wir $\exists x_1 \ldots x_n$ (ebenso für $\forall$). Zur besseren Lesbarkeit der Formeln gebrauchen wir überflüssige Klammern. Wir lassen auch Klammern weg und lesen die Formeln gemäß der *Bindungsstärke* der logischen Zeichen:

Höchste Bindungsstärke:	$\neg\ \exists\ \forall$
	$\wedge$
	$\vee$
Niedrigste Bindungsstärke:	$\to\ \leftrightarrow$

Definition Sei $\mathfrak{A}$ eine L–Struktur. Wir definieren für Belegungen $\vec{b}$ und L–Formeln ϕ die Relation

$$\mathfrak{A} \models \phi[\vec{b}]$$

durch Rekursion über den Aufbau von ψ:

$$\begin{aligned}
\mathfrak{A} \models t_1 \doteq t_2\,[\vec{b}] &\quad\Leftrightarrow\quad t_1^{\mathfrak{A}}[\vec{b}] = t_2^{\mathfrak{A}}[\vec{b}] \\
\mathfrak{A} \models Rt_1 \ldots t_n\,[\vec{b}] &\quad\Leftrightarrow\quad R^{\mathfrak{A}}\left(t_1^{\mathfrak{A}}[\vec{b}], \ldots, t_n^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]\right) \\
\mathfrak{A} \models \neg\psi\,[\vec{b}] &\quad\Leftrightarrow\quad \mathfrak{A} \not\models \psi\,[\vec{b}] \\
\mathfrak{A} \models (\psi_1 \wedge \psi_2)\,[\vec{b}] &\quad\Leftrightarrow\quad \mathfrak{A} \models \psi_1\,[\vec{b}] \text{ und } \mathfrak{A} \models \psi_2\,[\vec{b}] \\
\mathfrak{A} \models \exists x\psi\,[\vec{b}] &\quad\Leftrightarrow\quad \text{es gibt ein } a \in A \text{ mit } \mathfrak{A} \models \psi\ \left[\vec{b}\frac{a}{x}\right]
\end{aligned}$$

Dabei ist (wenn $x = v_i$)

$$\vec{b}\frac{a}{x} = (b_0, \ldots, b_{i-1}, a, b_{i+1,\ldots}).$$

Wenn $\mathfrak{A} \models \phi[\vec{b}]$ sagt man „ *ϕ trifft in $\mathfrak{A}$ auf $\vec{b}$ zu*“ oder „ *$\vec{b}$ erfüllt ϕ* “.

Damit diese Definition sinnvoll wird, muß man sich von der eindeutigen Lesbarkeit von Formeln überzeugen: Wenn $Rt_1, \ldots, t_n = Rt'_1, \ldots, t'_n$, so ist $t_1 = t'_1, \ldots, t_n = t'_n$. Und $(\psi_1 \wedge \psi_2) = (\psi'_1 \wedge \psi'_2)$ impliziert $\psi_1 = \psi'_1$ und $\psi_2 = \psi'_2$.

Es ist klar, daß unsere Abkürzungen die intendierte Interpretation haben. Also, daß z.B.

$$\mathfrak{A} \models (\psi_1 \to \psi_2)[\vec{b}] \iff \text{wenn } \mathfrak{A} \models \psi_1[\vec{b}], \text{ dann } \mathfrak{A} \models \psi_2[\vec{b}].$$

Ob ϕ in $\mathfrak{A}$ auf $\vec{b}$ zutrifft, hängt nur von den *freien* Variablen von ϕ ab:

Definition Die Variable x kommt *frei* in der Formel ϕ vor, wenn sie an einer Stelle vorkommt, die nicht im Wirkungsbereich eines Quantors $\exists x$ liegt. Präzis definiert durch Rekursion nach dem Aufbau von ϕ:

$$\begin{aligned}
x \text{ frei in } t_1 \doteq t_2 &\quad\Leftrightarrow\quad x \text{ kommt in } t_1 \text{ oder in } t_2 \text{ vor.} \\
x \text{ frei in } Rt_1 \ldots t_n &\quad\Leftrightarrow\quad x \text{ kommt in einem der } t_i \text{ vor.} \\
x \text{ frei in } \neg\psi &\quad\Leftrightarrow\quad x \text{ frei in } \psi \\
x \text{ frei in } (\psi_1 \wedge \psi_2) &\quad\Leftrightarrow\quad x \text{ frei in } \psi_1 \text{ oder } x \text{ frei in } \psi_2 \\
x \text{ frei in } \exists y\ \psi &\quad\Leftrightarrow\quad x \neq y \text{ und } x \text{ frei in } \psi
\end{aligned}$$

Zum Beispiel kommt in $\forall v_0(\exists v_1 R(v_0, v_1) \wedge P(v_1))$ die Variable v_0 nicht frei vor. v_1 kommt gebunden und frei vor.

Satz 2.5 *Wenn $\vec{b}$ und $\vec{c}$ an allen Variablen, die frei in ϕ vorkommen, übereinstimmen, ist*

$$\mathfrak{A} \models \phi[\vec{b}] \Leftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi[\vec{c}].$$

Beweis:

Durch Induktion über den Aufbau von ϕ. □

Wenn wir eine Formel in der Form $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ schreiben, meinen wir:

- daß die x_i paarweise verschiedene Variable sind,
- daß in ϕ nur Variable aus $\{x_1, \ldots, x_n\}$ frei vorkommen.

Wenn dann $a_1, \ldots, a_n$ Elemente der Struktur $\mathfrak{A}$ sind, ist wegen 2.5

$$\mathfrak{A} \models \phi[a_1, \ldots, a_n]$$

durch $\mathfrak{A} \models \phi[\vec{b}]$ für eine Belegung $\vec{b}$ mit $\vec{b}(x_i) = a_i$ wohldefiniert.

Definition Eine *Aussage* ϕ ist eine Formel ohne freie Variable. Wir schreiben $\mathfrak{A} \models \phi$, wenn $\mathfrak{A} \models \phi[\vec{b}]$ für ein (alle) $\vec{b}$.

$\mathfrak{A}$ heißt dann Modell von ϕ. Man sagt auch ϕ *gilt in* $\mathfrak{A}$.

Wenn $\phi = \phi(x_1, \ldots, x_n)$, und $t_1, \ldots, t_n$ Terme sind, bezeichnen wir mit

$$\phi(t_1, \ldots, t_n)$$

die Formel, die aus ϕ entsteht, wenn wir zuerst die gebundenen Variablen so umbenennen, daß sie verschieden sind von allen Variablen, die in den t_i vorkommen. Und wenn wir dann alle freien Vorkommen der x_i durch t_i ersetzen.

Lemma 2.6 (Substitutionslemma)

$$\mathfrak{A} \models \phi(t_1, \ldots, t_n)[\vec{b}] \iff \mathfrak{A} \models \phi\left[t_1^{\mathfrak{A}}[\vec{b}], \ldots, t_n^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]\right]$$

Beweis:
Leicht, durch Induktion über den Aufbau von ϕ. □

Beachte den (trivialen) Spezialfall

$$\mathfrak{A}_A \models \phi(a_1, \ldots, a_n) \iff \mathfrak{A} \models \phi[a_1, \ldots, a_n].$$

Wir verwenden häufig eine légère Notation und schreiben einfach

$$\mathfrak{A} \models \phi(a_1, \ldots, a_n).$$

Sei P ein neues n–stelliges Relationszeichen und $\phi = \phi(P)$ eine $L(P) = L \cup \{P\}$–Aussage. Weiter sei $\pi(x_1, \ldots, x_n)$ eine L–Formel. Wir ersetzen jetzt jedes Vorkommen von P in ϕ durch π. Das heißt, daß jede Teilformel $Pt_1 \ldots t_n$ durch $\pi(t_1 \ldots t_n)$ ersetzt wird. Die so gewonnen L–Aussage nennen wir $\phi(\pi)$. Man zeigt leicht:

Lemma 2.7

$$\mathfrak{A} \models \phi(\pi) \iff (\mathfrak{A}, \pi(\mathfrak{A})) \models \phi(P)$$

wobei $\pi(\mathfrak{A}) = \{\overline{a} \mid \mathfrak{A} \models \pi[\overline{a}]\}$.

Atomare und negiert atomare Formeln nennen wir *basic*. Formeln ohne Quantoren (wir sagen auch *quantorenfreie* Formeln) sind boolesche Kombinationen von basic Formeln, das heißt sie entstehen aus basic Formeln durch sukzessives Anwenden von $\neg$ und $\wedge$. Dieser Aufbauprozess läßt sich in zwei besonders einfache Formen bringen, die disjunktive und konjunktive Normalform.

Lemma 2.8 *Jede quantorenfreie Formel ist äquivalent zu einer Formel der Form*

$$\bigwedge_{i<m} \bigvee_{j<m_i} \pi_{ij}$$

und einer Formel der Form

$$\bigvee_{i<m} \bigwedge_{j<m_i} \pi_{ij},$$

für basic Formeln π_{ij}. Die erste Form ist die disjunktive *Normalform, die zweite die* konjunktive *Normalform.*

Wir nennen dabei zwei Formeln äquivalent, wenn sie in allen Strukturen auf die gleichen Variablenbelegungen zutreffen. $\bigwedge_{i<m} \pi_i$ ist natürlich die Konjunktion der π_i und $\bigvee_{i<m} \pi_i$ die Disjunktion. Wir beachten die Konvention, daß $\bigwedge_{i<1} \pi_i = \bigvee_{i<1} \pi_i = \pi_0$. Es ist manchmal bequem, auch die leere Konjunktion und die leere Disjunktion zuzulassen. Wir führen dazu zwei neue Formeln ein: die *immer wahre* Aussage $\top$ und *immer falsche* Aussage $\bot$. Dann setzt man sinnvollerweise

$$\bigwedge_{i<0} \pi_0 = \top$$

$$\bigvee_{i<0} \pi_0 = \bot$$

Beweis:

Um zum Beispiel die disjunktiven Normalform zu konstruieren, zieht man mit Hilfe der Äquivalenzen

$$\begin{aligned} \neg\neg\phi &\sim \phi \\ \neg(\phi \wedge \psi) &\sim (\neg\phi \vee \neg\psi) \\ \neg(\phi \vee \psi) &\sim (\neg\phi \wedge \neg\psi) \end{aligned}$$

die Negationszeichen unmittelbar vor die atomaren Formeln und mir Hilfe von

$$(\phi \vee (\psi \wedge \rho)) \sim ((\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \rho))$$

die Disjunktionen nach innen. □

Lemma 2.9 *Jede Formel ist äquivalent zu einer Formel in pränexer Normalform:*

$$Q_1 x_1 \ldots Q_n x_n \phi$$

Die Q_i sind Quantoren ($\exists$ oder $\forall$) und ϕ ist quantorenfrei.

Beweis:

Wir betrachten Formeln, die mit $\neg, \wedge, \exists, \forall$ aufgebaut sind und die ziehen die

Quantoren mit

$$\begin{aligned} \neg\exists x\phi &\sim \forall x\neg\phi \\ \neg\forall x\phi &\sim \exists x\neg\phi \\ (\phi \wedge \exists x\psi(x,\bar{y})) &\sim \exists z\,(\phi \wedge \psi(z,\bar{y})) \\ (\phi \vee \forall x\psi(x,\bar{y})) &\sim \forall z\,(\phi \vee \psi(z,\bar{y})) \end{aligned}$$

nach außen. Wir haben dabei die gebundene Variable x durch eine Variable z ersetzt, die nicht frei in ϕ vorkommt. □

Folgerung *Jede Formel läßt sich äquivalent umformen in eine Formel in Negationsnormalform. Das sind Formeln, die sich aus basic Formeln mit* $\wedge, \vee, \exists, \forall$ *aufbauen.* □

Definition Eine Formel in Negationsnormalform, die keine Existenzquantoren enthält, heißt universell oder Allformel. Formeln in Negationsnormalform ohne Allquantoren heißen existentiell oder Existenzformel.

Man sieht leicht ein, daß ein Isomorphismus $h : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ die Gültigkeit von Formeln präserviert. Man hat

$$\mathfrak{A} \models \phi[a_1,\ldots,a_n] \iff \mathfrak{B} \models \phi[h(a_1),\ldots,h(a_n)].$$

Isomorphe Einbettungen erhalten nur die Gültigkeit von existentiellen Formeln:

Lemma 2.10 *$h : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ sei eine Einbettung. Dann ist für alle existentiellen*[6] *$\phi(x_1,\ldots,x_n)$ und alle $a_1,\ldots,a_n \in A$*

$$\mathfrak{A} \models \phi[a_1,\ldots,a_n] \implies \mathfrak{B} \models \phi[h(a_1),\ldots,h(a_n)].$$

Beweis:

Leicht durch Induktion über den Aufbau von ϕ: Für basic Formeln folgt die Behauptung aus der Definition einer Einbettung und 2.3. Die Induktionsschritte für $\wedge$ und $\vee$ sind trivial. Sei schließlich $\phi(\overline{x}) = \exists y\psi(\overline{x},y)$. Wenn $\mathfrak{A} \models \phi[\overline{a}]$, gibt es ein $a \in A$ mit $\mathfrak{A} \models \psi[\overline{a},a]$. Nach Induktion ist dann $\mathfrak{B} \models \psi[h(\overline{a}),h(a)]$. Es folgt $\mathfrak{B} \models \phi[h(\overline{a})]$. □

Sei $\mathfrak{A}$ eine L–Struktur. Das *atomare Diagramm* von $\mathfrak{A}$ ist

$$\mathrm{Diag}(\mathfrak{A}) = \{\phi \text{ basic } L(A)\text{–Aussage} \mid \mathfrak{A}_A \models \phi\}$$

die Menge aller basic Aussagen mit Parametern aus A, die in $\mathfrak{A}$ gelten.

Lemma 2.11 *Die Modelle von* $\mathrm{Diag}(\mathfrak{A})$ *sind genau die Strukturen* $(\mathfrak{B}, h(a))_{a\in A}$ *für Einbettungen $h : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$.*

[6] für universelle ϕ gilt dual $\mathfrak{B} \models \phi[h(a_1),\ldots,h(a_n)] \implies \mathfrak{A} \models \phi[a_1,\ldots,a_n]$.

Beweis:

Daß die Strukturen $(\mathfrak{B}, h(a))_{a \in A}$ Modelle des atomaren Diagramms sind, folgt aus 2.10. Die Umkehrung gilt, weil eine Abbildung h genau dann eine Einbettung ist, wenn sie alle Formeln der Form

$$
\begin{array}{l}
(\neg)\, x_1 \doteq x_2 \\
c = x_1 \\
f(x_1, \ldots, x_n) \doteq x_0 \\
(\neg)\, R(x_1, \ldots, x_n)
\end{array}
$$

präserviert. □

3 Theorien

Definition Eine L–Theorie T ist eine Menge von L–Aussagen.

Eine L–Struktur $\mathfrak{A}$ ist ein *Modell* von T,

$$\mathfrak{A} \models T,$$

wenn $\mathfrak{A}$ Modell aller Aussagen aus T ist. Wenn T ein Modell hat, heißt T konsistent, oder widerspruchsfrei.

Lemma 3.1 *Sei T eine L–Theorie und K eine Erweiterung von L. Dann ist T genau dann als L–Theorie konsistent, wenn T als K–Theorie konsistent ist.*

Beweis:

Das folgt aus der (trivialen) Tatsache, daß sich jede L–Struktur zu einer K–Struktur expandieren läßt. □

Beispiele:

In den folgenden Beispielen schreiben wir, wie in der Algebra üblich 0 und 1 für die Zeichen $\underline{0}$ und $\underline{1}$. Den Multplikationspunkt $\cdot$ lassen wir weg und Punktrechnung geht vor Strichrechnung.

$\mathrm{T_{AG}}$, die Theorie der abelschen Gruppen, hat die Axiome

- $\forall x, y, z\ (x + y) + z \doteq x + (y + z)$
- $\forall x\ 0 + x \doteq x$
- $\forall x\ (-x) + x \doteq 0$
- $\forall x, y\ x + y \doteq y + x$

$\mathrm{T_R}$, die Theorie der kommutativen Ringe:

- $\mathrm{T_{AG}}$
- $\forall x, y, z\ (xy)z \doteq x(yz)$
- $\forall x\ 1x \doteq x$
- $\forall x, y\ xy \doteq yx$
- $\forall x, y, z\ x(y + z) \doteq xy + xz$

$\mathrm{T_K}$, die Theorie der Körper:

- $\mathrm{T_R}$
- $\neg 0 \doteq 1$
- $\forall x\ (\neg x \doteq 0 \to \exists y\ xy \doteq 1)$

Definition Eine Aussage ϕ folgt aus T, wenn ϕ in allen Modellen von T gilt. Wir schreiben

$$T \vdash \phi.$$

Aussagen, die aus $\emptyset$ folgen, heißen allgemeingültig.

Die wichtigsten Eigenschaften der Folgerungsrelation sind:

Lemma 3.2

1. *Wenn $T \vdash \phi$ und $T \vdash (\phi \to \psi)$ ist $T \vdash \psi$.*
2. *Wenn $T \vdash \phi(c_1, \ldots, c_n)$ und die Konstanten $c_1, \ldots, c_n$ nicht in T vorkommen, ist $T \vdash \forall x_1 \ldots x_n \phi(x_1, \ldots, x_n)$.*

Beweis:

Wir beweisen 2: Sei $L' = L \setminus \{c_1, \ldots, c_n\}$. Wenn die L'–Struktur $\mathfrak{A}$ ein Modell von T ist und $a_1, \ldots, a_n$ beliebige Elemente, ist $(\mathfrak{A}, a_1, \ldots, a_n) \models \phi(c_1, \ldots, c_n)$, das heißt $\mathfrak{A} \models \forall x_1 \ldots x_n \phi(x_1, \ldots, x_n)$. Also ist $T \vdash \forall x_1 \ldots x_n \phi(x_1, \ldots, x_n)$ (im Sinne von L' und daher wegen 3.1 auch im Sinne von L). □

Wir verallgemeinern diesen Begriff auf Theorien S: $T \vdash S$ heißt, daß alle Modelle von T Modelle von S sind. S und T heißen äquivalent, wenn S und T die gleichen Modelle haben. In Zeichen: $T \equiv S$.

Wir halten eine Sprache L fest. T sei eine L–Theorie und $\mathcal{K}$ eine Klasse von L–Strukturen. Wir verwenden folgende Notationen

- $\mathrm{Mod}(T) = \{\mathfrak{A} \mid \mathfrak{A} \models T\}$, die Modellklasse von T.
- $\mathrm{Th}(\mathcal{K}) = \{\phi \mid \mathfrak{A} \models \phi \text{ für alle } \mathfrak{A} \in \mathcal{K}\}$, die Theorie von $\mathcal{K}$.
- $\mathrm{Ded}(T) = \{\phi \mid T \vdash \phi\}$, der deduktive Abschluß von T.

T heißt deduktiv abgeschlossen, wenn $\mathrm{Ded}(T) = T$. Klassen der Form $\mathrm{Mod}(T)$ heißen elementar.

Satz 3.3 *T, S seien Theorien und $\mathcal{K}$ ein Klasse von Strukturen.*

1. *T ist genau dann deduktiv abgeschlossen, wenn T die Theorie einer Klasse von Strukturen ist.*
2. $T \vdash S \;\Leftrightarrow\; \mathrm{Ded}(S) \subset \mathrm{Ded}(T)$
3. $\mathrm{Ded}(T) = \mathrm{Th}(\mathrm{Mod}(T))$

Beweis:

Klar. □

Definition Eine konsistente L–Theorie T ist vollständig, wenn für alle L–Aussagen ϕ

$$T \vdash \phi \;\text{ oder }\; T \vdash \neg\phi.$$

Dieser Begriff hängt von L ab! Wenn T vollständig ist und K eine Erweiterung von L ist, wird im allgemeinen T als K–Theorie nicht mehr vollständig sein. Typisches Beispiel einer vollständigen Theorie ist die Theorie $\mathrm{Th}(\mathfrak{A})$ einer einzelnen Struktur.

Lemma 3.4 *Eine konsistente Theorie T ist genau dann vollständig, wenn* $\mathrm{Ded}(T)$ *maximal konsistent ist. Das bedeutet, daß $T \vdash S$ für jede konsistente Erweiterung S von T.*

Beweis:

Wenn weder ϕ noch $\neg\phi$ aus T folgt, nennen wir ϕ unabhängig von T. ϕ ist genau dann unabhängig von T, wenn $T \cup \{\phi\}$ eine im Sinne von $\vdash$ echte und konsistente Erweiterung von T ist. Daraus folgt die Behauptung sofort. □

Definition Zwei L–Strukturen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ heißen elementar äquivalent,

$$\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B},$$

wenn für alle L–Aussagen ϕ

$$\mathfrak{A} \models \phi \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{B} \models \phi$$

Isomorphe Strukturen sind immer elementar äquivalent.

Lemma 3.5 *T sei eine konsistente Theorie. Dann sind äquivalent*

a) T ist vollständig.

b) Alle Modelle von T sind elementar äquivalent.

c) $T \equiv \mathrm{Th}(\mathfrak{A})$ für eine geeignete Struktur $\mathfrak{A}$.

Beweis:

a⇒c: Sei $\mathfrak{A}$ ein beliebiges Modell von T. Wenn ϕ in $\mathfrak{A}$ gilt, ist $T \nvdash \neg\phi$ und daher $T \vdash \phi$. Also ist $\mathrm{Ded}(T) = \mathrm{Th}(\mathfrak{A})$.

c⇒b: Wenn $\mathfrak{B} \models T$ ist $\mathfrak{B} \models \mathrm{Th}(\mathfrak{A})$ und daher $\mathfrak{B} \equiv \mathfrak{A}$. Man beachte, daß $\equiv$ eine Äquivalenzrelation ist.

b⇒a: Sei $\mathfrak{A}$ ein Modell von T. Wenn ϕ in $\mathfrak{A}$ gilt, gilt ϕ in allen Modellen von T, also $T \vdash \phi$. Sonst gilt $\neg\phi$ und wir haben $T \vdash \neg\phi$ □

Kapitel 2

Elementare Unterstrukturen und der Kompaktheitssatz

4 Elementare Unterstrukturen

$\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ seien zwei L–Strukturen. Eine Abbildung $h : A \to B$ heißt elementar, wenn sie die Gültigkeit beliebiger Formeln $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ präserviert[1]. Das heißt, daß

$$\mathfrak{A} \models \phi[a_1, \ldots, a_n] \Longleftrightarrow \mathfrak{B} \models \phi[h(a_1), \ldots, h(a_n)]$$

für alle $a_1, \ldots, a_n \in A$. Weil h insbesondere quantorenfreie Aussagen präserviert, ist h eine Einbettung. Man nennt darum h auch elementare Einbettung. Wir schreiben

$$h : \mathfrak{A} \xrightarrow{\prec} \mathfrak{B}$$

Das folgende Lemma ist klar.

Lemma 4.1 *Die Modelle von* $\mathrm{Th}(\mathfrak{A}_A)$ *sind genau die Strukturen der Form* $(\mathfrak{B}, h(a))_{a \in A}$ *für elementare Einbettungen* $h : \mathfrak{A} \xrightarrow{\prec} \mathfrak{B}$.

$\mathrm{Th}(\mathfrak{A}_A)$ ist das elementare Diagramm von $\mathfrak{A}$.

Eine Unterstruktur $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{B}$ ist *elementar*, wenn die Inklusionsabbildung elementar ist, wenn also

$$\mathfrak{A} \models \phi[a_1, \ldots, a_n] \Longleftrightarrow \mathfrak{B} \models \phi[a_1, \ldots, a_n].$$

Wir schreiben $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$. $\mathfrak{B}$ heißt elementare Erweiterung von $\mathfrak{A}$.

Satz 4.2 (Tarskis Test) *Sei* $\mathfrak{B}$ *eine* L*–Struktur und* A *eine Teilmenge von* B*. Dann ist* A *genau dann Universum einer elementaren Unterstruktur, wenn jede* $L(A)$*–Formel* $\phi(x)$*, die in* $\mathfrak{B}$ *erfüllbar ist, von einem Element von* A *erfüllt wird.*

[1] Eigentlich heißt das nur, daß alle Formeln, die in $\mathfrak{A}$ gelten, auch in $\mathfrak{B}$ gelten. Wenn man zur Negation übergeht, sieht man aber, daß daraus die Umkehrung folgt.

Beweis:

Wenn $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B} \models \exists x \phi(x)$, so gilt auch $\mathfrak{A} \models \exists x \phi(x)$ und es gibt ein $a \in A$ mit $\mathfrak{A} \models \phi(a)$. Es folgt $\mathfrak{B} \models \phi(a)$.

Sei umgekehrt die Bedingung von Tarskis Test erfüllt. Zuerst müssen wir zeigen, daß A Universum einer Unterstruktur $\mathfrak{A}$ ist. Die $L(A)$–Formel $x \doteq x$ ist in $\mathfrak{B}$ erfüllbar, also ist A nicht leer. Wenn $f \in L$ ein n–stelliges Funktionszeichen ist $(n \geq 0)$ und $a_1, \ldots, a_n$ aus A, betrachten wir die Formel

$$\phi(x) = f(a_1, \ldots, a_n) \doteq x.$$

$\phi(x)$ wird in A erfüllt, also ist A unter den Operationen $f^{\mathfrak{B}}$ abgeschlossen.
Jetzt zeigen wir durch Induktion über den Aufbau der $L(A)$–Aussage ψ, daß für alle ψ

$$\mathfrak{A} \models \psi \iff \mathfrak{B} \models \psi.$$

Für atomare Aussagen ist das klar. Die Induktionsschritte für $\psi = \neg\phi$ und $\psi = (\phi_1 \wedge \phi_2)$ sind trivial.
Sei schließlich $\psi = \exists x \phi(x)$. Wenn ψ in $\mathfrak{A}$ gilt, gibt es ein $a \in A$, mit $\mathfrak{A} \models \phi(a)$. Die Induktionsvoraussetzung ergibt $\mathfrak{B} \models \phi(a)$ und daher $\mathfrak{B} \models \psi$. Wenn umgekehrt ψ in $\mathfrak{B}$ gilt, finden wir ein $a \in B$ mit $\mathfrak{B} \models \phi(a)$. Tarskis Test erlaubt es anzunehmen, daß $a \in A$. Jetzt schließen wir wieder mit Induktion, daß $\mathfrak{A} \models \phi(a)$ und daher $\mathfrak{A} \models \psi$. □

Folgerung 4.3 *S sei eine Teilmenge der L–Struktur $\mathfrak{B}$. Dann hat $\mathfrak{B}$ eine elementare Unterstruktur, die S enthält und höchstens die Mächtigkeit*

$$\max\{|S|, |L|, \aleph_0\}$$

hat.

Beweis:

Wir setzen $S_0 = S$. Wenn S_i schon definiert ist, wählen wir für jede $L(S_i)$–Formel $\phi(x)$ ein Element $a_\phi \in B$ mit $\mathfrak{B} \models \exists x \phi(x) \to \phi(a_\phi)$ und setzen $S_{i+1} = \{a_\phi \mid \phi\ L(S_i)\text{–Formel}\}$. Es ist klar, daß $A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$ Universum einer Unterstruktur ist. Wir müssen nur noch die Mächtigkeit von A abschätzen.

Eine L–Formel ist eine Folge aus Zeichen aus L, Hilfszeichen und logischen Zeichen. Das sind insgesamt $|L| + \aleph_0 = \max(|L|, \aleph_0)$ viele Zeichen. Also gibt es nach A.1.4 genau $\max(|L|, \aleph_0)$ viele L–Formeln.
Sei $\kappa = \max(|S|, |L|, \aleph_0)$. Es gibt κ viele $L(S)$–Formeln, also ist $|S_1| \leq \kappa$. Es ergibt sich induktiv, daß $|S_i| \leq \kappa$ für alle i. Schließlich ist $|A| \leq \kappa \cdot \aleph_0 = \kappa$. □

Ein gerichtete Familie $(\mathfrak{A}_i)_{i \in I}$ von Strukturen heißt elementar, wenn $\mathfrak{A}_i \prec \mathfrak{A}_j$ für alle $i \leq j$. Das folgende Lemma heißt Kettenlemma, weil es hauptsächlich auf elementare Ketten angewendet wird.

Satz 4.4 (Tarskis Kettenlemma) *Die Vereinigung einer elementaren gerichteten Familie ist elementare Erweiterung alle ihrer Mitglieder.*

Beweis:

Sei $\mathfrak{A} = \bigcup_{i \in I} (\mathfrak{A}_i)_{i \in I}$. Wir zeigen durch Induktion über den Aufbau von $\phi(\overline{x})$, daß für alle i und alle $\overline{a} \in \mathfrak{A}_i$

$$\mathfrak{A}_i \models \phi(\overline{a}) \Longleftrightarrow \mathfrak{A} \models \phi(\overline{a}).$$

Wenn ϕ atomar ist, ist nichts zu zeigen. Wenn ϕ eine Negation oder eine Konjunktion ist, folgt die Behauptung sofort per Induktion.
Sei $\phi(\overline{x}) = \exists y \psi(\overline{x}, y)$. $\phi(\overline{a})$ gilt genau dann in $\mathfrak{A}$, wenn es ein $b \in A$ mit $\mathfrak{A} \models \psi(\overline{a}, b)$ gibt. Weil die Familie gerichtet ist, liegt b immer in A_j für ein genügend großes $j \geq i$. Nach Induktionsvoraussetzung ist aber $\mathfrak{A} \models \psi(\overline{a}, b) \Longleftrightarrow \mathfrak{A}_j \models \psi(\overline{a}, b)$. Also gilt $\phi(\overline{a})$ in $\mathfrak{A}$ genau dann, wenn es in einem $\mathfrak{A}_j$ $(j \geq i)$ gilt. Aus $\mathfrak{A}_i \prec \mathfrak{A}_j$ folgt jetzt die Behauptung. $\square$

5 Der Kompaktheitssatz

Eine Theorie T heißt endlich erfüllbar, wenn jede endliche Teilmenge von T ein Modell hat.

Satz 5.1 (Kompaktheitssatz) *Endlich erfüllbare Theorien sind konsistent.*

Sei L eine Sprache und C eine Menge von neuen Konstanten. Wir nennen eine $L(C)$–Theorie T' eine Henkin–Theorie, wenn es für alle $L(C)$–Formeln $\phi(x)$ eine Konstante $c \in C$ gibt mit

$$\exists x \phi(x) \to \phi(c) \ \in \ T'.$$

Die Elemente von C sind die Henkin–Konstanten von T'.

Eine L'–Theorie T' ist „vollständig“, wenn sie endlich erfüllbar ist und $\phi \in T'$ oder $\neg\phi \in T'$ für alle L'–Aussagen ϕ. Eine konsistente Theorie ist genau dann „vollständig“, wenn sie vollständig und deduktiv abgeschlossen ist.

Der Kompaktheitssatz folgt aus den nächsten beiden Hilfssätzen.

Hilfssatz *Jede endlich erfüllbare L–Theorie T läßt sich zu einer „vollständigen“ Henkin–Theorie T^* erweitern.*

Der Hilfssatz folgt sofort aus dem Kompaktheitssatz: Wähle ein Modell $\mathfrak{A}$ von T. Dann ist $\mathrm{Th}(\mathfrak{A}_A)$ eine vollständige Henkin–Theorie mit A als der Menge der Henkin–Konstanten.

Beweis:
Wir definieren eine aufsteigende Folge $\emptyset = C_0 \subset C_1 \ldots$ von neuen Konstanten, indem wir jeder $L(C_i)$–Formel $\phi(x)$ eine Konstante $c_{\phi(x)}$ zuordnen und

$$C_{i+1} = \left\{ c_{\phi(x)} \;\middle|\; \phi(x) \ L(C_i)\text{–Formel} \right\}$$

setzen. C sei die Vereinigung der C_i und T^H die Menge aller Henkin–Axiome

$$\exists x \phi(x) \to \phi(c_{\phi(x)})$$

für $L(C)$–Formeln $\phi(x)$. Man sieht leicht, daß man jede L–Struktur zu einem Modell von T^H expandieren kann. Daraus folgt, daß $T \cup T^H$ eine endlich erfüllbare Henkin–Theorie ist.

Weil die Vereinigung einer Kette von endlich erfüllbaren Theorien wieder endlich erfüllbar ist, können wir Zorns Lemma anwenden und erhalten eine endliche erfüllbare $L(C)$–Theorie T^*, die $T \cup T^H$ enthält und maximal ist mit dieser Eigenschaft. Wie in 3.4 zeigen wir, daß T^* „vollständig“ sein muß: Wenn weder ϕ noch $\neg\phi$ zu T^* gehörten, wären weder $T^* \cup \{\phi\}$ noch $T^* \cup \{\neg\phi\}$ endlich erfüllbar. T^* hätte also eine endliche Teilmenge Δ, die weder mit ϕ noch mit $\neg\phi$ konsistent ist. Δ wäre also selbst inkonsistent und T^* wäre nicht endlich erfüllbar. Damit ist der Hilfssatz bewiesen. □

Hilfssatz *Jede „vollständige“ Henkin–Theorie T^* hat ein bis auf Isomorphie eindeutig bestimmtes Modell* aus Konstanten. *Das ist ein Modell*

$$(\mathfrak{A}, a_c)_{c\in C} \models T^*, n$$

für das zusätzlich $A = \{a_c \mid c \in C\}$.

Beweis:

Wir sagen, daß ϕ aus T^* „folgt“, wenn ϕ aus einer endlichen Teilmenge von T^* folgt. Weil T „vollständig“ ist, gehören alle Aussagen, die aus T^* „folgen“ wieder zu T^*.

Wir definieren für $c, d \in C$

$$c \simeq d \iff c \doteq d \in T^*$$

Weil $c \doteq c$ allgemeingültig ist, und weil $d \doteq c$ aus $c \doteq d$ folgt und $c \doteq e$ aus $c \doteq d$ und $d \doteq e$ folgt, ist $\simeq$ eine Äquivalenzrelation. Wir bezeichnen mit a_c die Äquivalenzklasse von c und setzen

$$A = \{a_c \mid c \in C\}.$$

Wir machen A zu einer L–Struktur $\mathfrak{A}$ durch die Definitionen

$$(1) \qquad R^{\mathfrak{A}}(a_{c_1}, \ldots, a_{c_n}) \iff R(c_1, \ldots, c_n) \in T^*$$

$$(2) \qquad f^{\mathfrak{A}}(a_{c_1}, \ldots, a_{c_n}) = a_{c_0} \iff f(c_1, \ldots, c_n) \doteq c_0 \in T^*$$

für Relationszeichen R und Funktionszeichen ($n \geq 0$–stellig) aus L.

Wir müssen die Wohldefiniertheit zeigen:
Für (1) ist zu zeigen, daß

$$a_{c_1} = a_{d_1}, \ldots, a_{c_n} = a_{d_n},\ R(c_1, \ldots, c_n) \in T^*$$

zur Folge hat, daß $R(d_1, \ldots, d_n) \in T^*$. Das ist in der Tat der Fall, weil $R(d_1, \ldots, d_n)$ aus

$$c_1 \doteq d_1, \ldots, c_n \doteq c_n\ R(c_1, \ldots, c_n)$$

folgt.
Für (2) ist einerseits zu zeigen, daß $a_{c_0} = a_{d_0}$, wenn

$$a_{c_1} = a_{d_1}, \ldots, a_{c_n} = a_{d_n},\ f(c_1, \ldots, c_n) \doteq c_0 \in T^*,\ f(d_1, \ldots, d_n) \doteq d_0 \in T^*.$$

Das geht so wie eben. Andererseits ist zu zeigen, daß es für alle $c_1, \ldots, c_n$ ein c_0 mit $f(c_1, \ldots, c_n) \doteq c_0 \in T^*$ gibt. Weil T^* eine Henkin–Theorie ist, gibt es ein c_0 mit

$$\exists x f(c_1, \ldots, c_n) \doteq x \to f(c_1, \ldots, c_n) \doteq c_0 \in T^*.$$

Weil aber die allgemeingültige Aussage $\exists x f(c_1, \ldots, c_n) \doteq x$ zu T^* gehört, gehört auch $f(c_1, \ldots, c_n) \doteq c_0$ zu T^*. Damit ist die Wohldefiniertheit gezeigt.

Sei $\mathfrak{A}^*$ die $L(C)$–Struktur $(\mathfrak{A}, a_c)_{c\in C}$. Wir zeigen durch Induktion über die Komplexität von ϕ, daß

$$\mathfrak{A}^* \models \phi \iff \phi \in T^*$$

für alle $L(C)$–Aussagen ϕ. Es gibt vier Fälle:

a) ϕ ist atomar.

Wenn ϕ die Gestalt $c \doteq d$ oder $R(c_1, \ldots, c_n)$ hat, gilt die Behauptung, weil wir $\mathfrak{A}^*$ gerade so konstruiert haben. Andere atomare Aussagen enthalten Funktionszeichen f (bzw. Konstanten) aus L und lassen sich schreiben als

$$\phi = \psi(f(c_1, \ldots, c_n))$$

für eine $L(C)$–Formel $\psi(x_1, \ldots, x_n)$. Wir wählen uns ein c_0 mit $f(c_1, \ldots, c_n) \doteq c_0 \in T^*$. Nach Konstruktion gilt $f(c_1, \ldots, c_n) \doteq c_0$ in $\mathfrak{A}^*$. Es folgt $\mathfrak{A}^* \models \phi \iff \psi(c_0)$ und $\phi \in T^* \iff \psi(c_0) \in T^*$. Also bleibt zu zeigen, daß $\mathfrak{A}^* \models \psi(c_0) \iff \psi(c_0) \in T^*$. Das gilt aber nach Induktionsvoraussetzung.

b) $\phi = \neg\psi$.

Weil T^* „vollständig“ ist, ist $\phi \in T^* \iff \psi \notin T^*$ und mit der Induktionsannahme folgt

$$\mathfrak{A}^* \models \phi \iff \mathfrak{A}^* \not\models \psi \iff \psi \notin T^* \iff \phi \in T^*.$$

c) $\phi = (\psi_1 \wedge \psi_2)$.

Weil T^* unter „Folgerungen“ abgeschlossen ist, gehört ϕ genau dann zu T^*, wenn ψ_1 und ψ_2 zu T^* gehören. Es folgt

$$\mathfrak{A}^* \models \phi \iff \mathfrak{A}^* \models \psi_i \,(i = 1, 2) \iff \psi_i \in T^* \,(i = 1, 2) \iff \phi \in T^*.$$

d) $\phi = \exists x \psi(x)$

Es ist

$$\mathfrak{A}^* \models \phi \Leftrightarrow \mathfrak{A}^* \models \psi(c) \text{ für ein } c \in C \Leftrightarrow \psi(c) \in T^* \text{ für ein } c \in C \Leftrightarrow \phi \in T^*.$$

Die zweite Äquivalenz ist die Induktionsvoraussetzung, die dritte sieht man so ein: Wenn $\phi \in T^*$, wählen wir ein c mit $\phi \to \psi(c) \in T^*$. Wenn dann $\phi \in T^*$, muß auch $\psi(c)$ zu T^* gehören.

□

Folgerung 5.2 *$T \vdash \phi$ genau dann wenn, $\Delta \vdash \phi$ für eine endliche Teilmenge Δ von T.*

Beweis:

ϕ folgt genau dann aus T, wenn $T \cup \{\neg\phi\}$ inkonsistent ist. □

Definition Sei $\mathfrak{A}$ eine L–Struktur und B eine Teilmenge von A. Eine Menge $\Sigma(x)$ von $L(B)$–Formeln (mit höchstens der freien Variable x) heißt endlich erfüllbar in $\mathfrak{A}$, wenn für alle $\phi_1(x) \ldots \phi_n(x)$ aus $\Sigma(x)$

$$\mathfrak{A} \models \exists x \; (\phi_1(x) \wedge \ldots \wedge \phi_n(x)) \,.$$

$a \in A$ realisiert $\Sigma(x)$, wenn a alle Formeln aus $\Sigma(x)$ erfüllt. Man schreibt auch

$$\mathfrak{A} \models \Sigma(a)$$

$\mathfrak{A}$ läßt $\Sigma(x)$ aus, wenn $\Sigma(x)$ nicht in $\mathfrak{A}$ realisiert wird.

Lemma 5.3 *Wenn $\Sigma(x)$ endlich erfüllbar in $\mathfrak{A}$ ist, wird $\Sigma(x)$ in einer geeigneten elementaren Erweiterung von $\mathfrak{A}$ realisiert.*

Beweis:
Sei c eine neue Konstante. $\Sigma(x)$ ist genau dann endlich erfüllbar in $\mathfrak{A}$, wenn

$$T^* = \mathrm{Th}(\mathfrak{A}_A) \cup \Sigma(c)$$

endlich erfüllbar ist. Die Modelle von T^* sind gerade elementare Erweiterungen von $\mathfrak{A}$ mit einem ausgezeichnetem Element, das $\Sigma(x)$ realisiert. □

Definition Eine Menge $p(x)$ von $L(B)$–Formeln ist ein *Typ* über B, wenn $p(x)$ maximal endlich erfüllbar ist. Wir bezeichnen mit

$$\mathrm{S}(B) = \mathrm{S}_1^{\mathfrak{A}}(B)$$

die Menge der Typen über B.
Maximal endlich erfüllbare Mengen von Formeln in den Variablen $x_1, \ldots, x_n$ heißen n–Typen. $\mathrm{S}_n(B) = \mathrm{S}_n^{\mathfrak{A}}(B)$ ist die Menge der n–Typen über B.

Jedes Element a bestimmt einen Typ

$$\mathrm{tp}(a/B) = \mathrm{tp}^{\mathfrak{A}}(a/B) = \{\phi(x) \mid \mathfrak{A} \models \phi(a),\ \phi \text{ eine } L(B)\text{–Formel}\}$$

a realisiert den Typ p genau dann, wenn $p = \mathrm{tp}(a/B)$.

Folgerung 5.4 *Jedes Modell $\mathfrak{A}$ hat eine elementare Erweiterung $\mathfrak{B}$, in der alle Typen über A realisiert sind.*

Beweis:
Wir wählen für jedes $p \in \mathrm{S}(A)$ eine neue Konstante c_p. Gesucht ist ein Modell von

$$\mathrm{Th}(\mathfrak{A}_A) \cup \bigcup_{p \in \mathrm{S}(A)} p(c_p).$$

Man sieht leicht, daß diese Theorie endlich erfüllbar ist, weil die p endlich erfüllbar sind.

Ich gebe einen zweiten Beweis der nur von 5.3 Gebrauch macht: Sei $(p_\alpha)_{\alpha<\lambda}$ eine Aufzählung von $\mathrm{S}(A)$, dabei sei λ eine Ordinalzahl (siehe A.2). Wir konstruieren mit A.2.1 eine elementare Kette

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{A}_0 \prec \mathfrak{A}_1 \prec \ldots \mathfrak{A}_\beta \ldots \quad (\beta \leq \lambda)$$

in der p_α in $\mathfrak{A}_{\alpha+1}$ realisiert ist.

Nehmen wir an, daß die elementare Kette $(\mathfrak{A}_{\alpha'})_{\alpha'<\beta}$ schon konstruiert sind. Wenn β eine Limeszahl ist, nehmen wir für $\mathfrak{A}_\beta$ die Vereinigung der Kette[2]. Die

[2] Man nennt eine nach Ordinalzahlen indizierte elementare Kette $(\mathfrak{A}_\alpha)$ *stetig*, wenn $\mathfrak{A}_\beta = \bigcup_{\alpha<\beta} \mathfrak{A}_\alpha$ für alle Limeszahlen β.

verlängerte Kette $(\mathfrak{A}_{\alpha'})_{\alpha' \leq \beta}$ ist elementar wegen 4.4. Wenn $\beta = \alpha + 1$, beachten wir, daß p_α auch in $\mathfrak{A}_\alpha$ endlich erfüllbar ist. Wir können also p_α in einem $\mathfrak{A}_\beta \succ \mathfrak{A}_\alpha$ realisieren.
$\mathfrak{B} = \mathfrak{A}_\lambda$ leistet das Gewünschte. □

6 Der Satz von Löwenheim–Skolem

Satz 6.1 (Löwenheim–Skolem) *Sei $\mathfrak{B}$ eine L–Struktur und S eine Teilmenge von B. κ sei eine Kardinalzahl.*

1. *Wenn*
$$\max\{|L|, |S|, \aleph_0\} \leq \kappa \leq |\mathfrak{B}|,$$
gibt es eine elementare Unterstruktur $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ der Mächtigkeit κ, die S enthält.

2. *Wenn $\mathfrak{B}$ unendlich ist und*
$$\max\{|L|, |\mathfrak{B}|\} \leq \kappa,$$
hat $\mathfrak{B}$ eine elementare Erweiterung der Mächtigkeit κ.

Beweis:

1: Wähle ein Menge $S \subset S' \subset B$ der Mächtigkeit κ und wende 4.3 an.

2: Zuerst verschaffen wir uns eine elementare Erweiterung $\mathfrak{B}'$, die mindestens die Mächtigkeit κ hat. Dazu wählen wir uns eine Menge C von neuen Konstanten, die die Mächtigkeit κ hat. Die Theorie
$$\mathrm{Th}(\mathfrak{B}_B) \cup \{\neg c \doteq d \mid c, d \in C,\ c \neq d\}$$
ist endlich erfüllbar, weil $\mathfrak{B}$ unendlich ist[3]. Ein Modell $(\mathfrak{B}'_B, b_c)_{c \in C}$ liefert ein elementare Erweiterung von $\mathfrak{A}$ mit κ–vielen verschiedenen Elementen (b_c). Schießlich wenden wir auf $\mathfrak{B}'$ und $S = B$ den ersten Teil des Satzes an. □

Folgerung 6.2 *Eine Theorie, die ein unendliches Modell hat, hat Modelle in jeder Mächtigkeit $\kappa \geq \max(|L|, \aleph_0)$.* □

Definition[4] κ sei eine unendliche Kardinalzahl. Eine Theorie T heißt κ–kategorisch, wenn alle Modelle von T der Mächtigkeit κ isomorph sind.

Satz 6.3 (Vaughts Test) *κ–kategorische Theorien T sind vollständig, wenn man noch voraussetzt daß*

a) T konsistent ist,

b) T keine endlichen Modell hat,

c) und $|L| \leq \kappa$.

[3] Man findet Modelle durch geeignete Interpretation der neuen Konstanten in $\mathfrak{B}$

[4] Vorläufige Definition (siehe S.28)

Beweis:

Wir müssen zeigen, daß alle Modelle $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ von T elementar äquivalent sind. Weil $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ unendlich sind, haben $\mathrm{Th}(\mathfrak{A})$ und $\mathrm{Th}(\mathfrak{B})$ Modelle $\mathfrak{A}'$ und $\mathfrak{B}'$ der Mächtigkeit κ. Weil $\mathfrak{A}'$ und $\mathfrak{B}'$ isomorph sind, folgt

$$\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{A}' \equiv \mathfrak{B}' \equiv \mathfrak{B}.$$

□

Wir nehmen 6.3 zum Anlass, unsere Definition zu verschärfen. Eine κ–kategorische Theorie soll ab jetzt immer **vollständig** sein.

Kapitel 3

Quantorenelimination

7 Erhaltungssätze

Wir halten eine Sprache L fest.

Lemma 7.1 (Trennungslemma) *T_1 und T_2 seien zwei Theorien. $\mathcal{H}$ sei eine Menge von Aussagen, die abgeschlossen ist unter $\wedge$ und $\vee$ und $\top$ und $\bot$ enthält, die wahre und die falsche Aussage. Dann sind äquivalent:*

a) Es gibt ein $\phi \in \mathcal{H}$ mit

$$T_1 \vdash \phi \text{ und } T_2 \vdash \neg\phi$$

b) Für alle Modelle $\mathfrak{A}_1$ von T_1 und $\mathfrak{A}_2$ von T_2 gibt es ein $\phi \in \mathcal{H}$ mit

$$\mathfrak{A}_1 \models \phi \text{ und } \mathfrak{A}_2 \models \neg\phi$$

Wir sagen in a), daß ϕ T_1 und T_2 trennt. Und in b), daß ϕ $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_2$ trennt.
Beweis:

a) $\Rightarrow$ b):
Wenn ϕ T_1 und T_2 trennt, trennt ϕ auch alle Modelle von T_1 und T_2.

b) $\Rightarrow$ a):
Sei $\mathfrak{A}_1$ ein Modell von T_1 und $\mathcal{H}_{\mathfrak{A}_1}$ die Menge aller Aussagen aus $\mathcal{H}$, die in $\mathfrak{A}_1$ gelten. Wegen b) haben $\mathcal{H}_{\mathfrak{A}_1}$ und T_2 kein gemeinsames Modell. Der Kompaktheitssatz hat zur Folge, daß schon eine endliche Konjunktion $\phi_{\mathfrak{A}_1}$ von Aussagen aus $\mathcal{H}_{\mathfrak{A}_1}$ mit T_2 unverträglich ist. Weil jedes $\mathfrak{A}_1$ ein Modell von $\phi_{\mathfrak{A}_1}$ ist, ist

$$T_1 \cup \{\neg\phi_{\mathfrak{A}_1} \mid \mathfrak{A}_1 \models T_1\}$$

inkonsistent. Daraus folgt mit dem Kompaktheitssatz, daß T_1 schon eine endliche Disjunktion ϕ der $\phi_{\mathfrak{A}_1}$ impliziert. Dieses ϕ trennt T_1 und T_2. □

Satz 7.2 *T_1 und T_2 seien Theorien. Dann sind äquivalent:*

a) *Es gibt eine universelle Aussage, die T_1 und T_2 trennt.*

b) *Wenn $\mathfrak{A}_1$ ein Modell von T_1 ist und $\mathfrak{A}_2$ ein Modell von T_2, kann $\mathfrak{A}_2$ keine Unterstruktur von $\mathfrak{A}_1$ sein.*

Beweis:

a) $\Rightarrow$ b):
Sei ϕ eine universelle Aussage, die T_1 und T_2 trennt. Sei $\mathfrak{A}_1$ ein Modell von T_1 und $\mathfrak{A}_2$ eine Unterstruktur. Weil $\mathfrak{A}_1$ ein Modell von ϕ ist, ist auch $\mathfrak{A}_2$ ein Modell von ϕ (2.10). $\mathfrak{A}_2$ kann daher kein Modell von T_2 sein.

b) $\Rightarrow$ a):
Wir wenden das Trennungslemma an. Seien $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_2$ Modelle von T_1 und T_2, die man nicht durch eine universelle Aussage trennen kann. Das kann man als

$$\mathfrak{A}_2 \Rightarrow_\exists \mathfrak{A}_1$$

notieren. Aus dem nächsten Lemma (7.3) folgt, daß $\mathfrak{A}_2$ eine Oberstruktur $\mathfrak{A}_1'$ hat, die elementar äquivalent zu $\mathfrak{A}_1$ ist. $\mathfrak{A}_1'$ ist wieder ein Modell von T_1. Das widerspricht b). □

Sei Δ eine Menge von Formeln. Für eine Abbildung $f : A \to B$ bedeutet

$$f : \mathfrak{A} \to_\Delta \mathfrak{B},$$

daß f alle Formeln aus Δ präserviert.

Lemma 7.3 *Sei T eine Theorie, $\mathfrak{A}$ ein Struktur und Δ eine Menge von Formeln, die unter Existenzquantifizierung, Konjunktion und Variablensubstitution abgeschlossen ist. Dann sind äquivalent:*

a) *Alle Aussagen $\phi \in \Delta$, die in $\mathfrak{A}$ gelten, sind konsistent mit T.*

b) *Es gibt ein Modell $\mathfrak{B} \models T$ und eine Abbildung $f : \mathfrak{A} \to_\Delta \mathfrak{B}$.*

Wenn Δ eine Menge von Formeln ist, bedeutet

$$\mathfrak{A} \Rightarrow_\Delta \mathfrak{B},$$

daß alle Aussagen aus Δ, die in $\mathfrak{A}$ gelten, auch in $\mathfrak{B}$ gelten. Wenn man das Lemma auf $T = \mathrm{Th}(\mathfrak{B})$ anwendet, sieht man, daß genau dann $\mathfrak{A} \Rightarrow_\Delta \mathfrak{B}$, wenn es ein

$$f : \mathfrak{A} \to_\Delta \mathfrak{B}' \equiv \mathfrak{B}$$

gibt.

Beweis:

b) $\Rightarrow$ a):
Sei $f : \mathfrak{A} \to_\Delta \mathfrak{B} \models T$ gegeben. Wenn $\phi \in \Delta$ in $\mathfrak{A}$ gilt, gilt ϕ auch in $\mathfrak{B}$ und ist folglich mit T konsistent.

a) $\Rightarrow$ b):
Wir betrachten $\mathrm{Th}_\Delta(\mathfrak{A}_A)$, die Menge aller Aussagen $\delta(\overline{a})$, $(\delta(\overline{x}) \in \Delta)$, die in

$\mathfrak{A}$ gelten. Die Modelle $(\mathfrak{B}, f(a)_{a\in A})$ dieser Theorie entsprechen gerade den $f : \mathfrak{A} \to_\Delta \mathfrak{B}$. Wir suchen also ein Modell von $T \cup \mathrm{Th}_\Delta(\mathfrak{A}_A)$. Dazu zeigen wir die endliche Erfüllbarkeit. Wenn $T \cup \mathrm{Th}_\Delta(\mathfrak{A}_A)$ nicht endlich erfüllbar wäre, gäbe es (weil Δ unter Konjunktionen abgeschlossen ist) ein $\delta(\overline{a}) \in \mathrm{Th}_\Delta(\mathfrak{A}_A)$ mit $T \vdash \neg\delta(\overline{a})$. Wegen 3.2 ist $T \vdash \forall\overline{x}\,\neg\delta(\overline{x})$. $\phi = \exists\overline{x}\,\delta(\overline{x})$ ist eine Δ–Aussage, die in $\mathfrak{A}$ gilt, aber inkonsistent mit T ist. □

Folgerung 7.4 *T sei ein Theorie.*

1. *Sei $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ eine Formel. Dann sind äquivalent:*
   a) *Es gibt eine universelle Formel, die modulo T zu $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ äquivalent ist.*
   b) *$\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$ seien Modelle von T und $a_1, \ldots, a_n \in A$. Dann gilt $\phi(a_1, \ldots, a_n)$ in $\mathfrak{A}$, wenn $\phi(a_1, \ldots, a_n)$ in $\mathfrak{B}$ gilt.*
2. *Wir nennen eine Theorie aus universellen Aussagen universell. T ist genau dann äquivalent zu einer universellen Theorie, wenn mit einem Modell $\mathfrak{B}$ von T auch alle Unterstrukturen von $\mathfrak{B}$ Modell von T sind.*

Beweis:

1): Nehmen wir an, daß b) gilt. Wir erweitern L um ein n–Tupel $\overline{c}$ von neuen Konstanten $c_1, \ldots, c_n$ und betrachten die Theorien

$$T_1 = T \cup \{\phi(\overline{c})\} \quad \text{und} \quad T_2 = T \cup \{\neg\phi(\overline{c})\}.$$

b) besagt gerade, daß Unterstrukturen von Modellen von T_1 keine Modelle von T_2 sein können. Nach 7.2 können wir T_1 und T_2 durch eine universelle $L(\overline{c})$–Aussage $\psi(\overline{c})$ trennen. Aus $T_1 \vdash \psi(\overline{c})$ folgt

$$T \vdash \forall\overline{x}\,(\phi(\overline{x}) \to \psi(\overline{x}))$$

und aus $T_2 \vdash \neg\psi(\overline{c})$ folgt

$$T \vdash \forall\overline{x}\,(\neg\phi(\overline{x}) \to \neg\psi(\overline{x})).$$

2): Unterstrukturen einer universellen Theorie sind natürlich wieder Modelle dieser Theorie. Jetzt nehmen wir an, daß T diese Eigenschaft hat. Sei ϕ ein Axiom von T. Wenn $\mathfrak{A}$ eine Unterstruktur von $\mathfrak{B}$, kann nicht $\mathfrak{B}$ ein Modell von T und gleichzeitig $\mathfrak{A}$ ein Modell von $\neg\phi$ sein. Nach 7.2 gibt es eine universelle Aussage ψ mit $T \vdash \psi$ und $\neg\phi \vdash \neg\psi$. Alle Axiome von T folgen also aus

$$T_\forall = \{\psi \mid T \vdash \psi,\ \psi \text{ universell}\}.$$

□

Definition $\forall\exists$–Formeln haben die Form

$$\forall x_1 \ldots x_n \psi$$

für existentielle Formeln ψ.

Definition Eine Theorie T ist induktiv, wenn die Vereinigung jeder gerichteten Familie von Modellen von T wieder ein Modell von T ist.

Satz 7.5 *T_1 und T_2 seien Theorien. Dann sind äquivalent:*

a) Es gibt eine $\forall\exists$–Aussage, die T_1 und T_2 trennt.

b) Kein Modell von T_2 ist Vereinigung einer Kette (oder einer gerichteten Familie) von Modellen von T_1.

Beweis:

a) $\Rightarrow$ b):
Sei ϕ eine $\forall\exists$–Aussage, die T_1 und T_2 trennt, $(\mathfrak{A}_i)_{i\in I}$ ein gerichtete Familie von Modellen von T_1 und $\mathfrak{B}$ die Vereinigung der $\mathfrak{A}_i$. Weil die $\mathfrak{A}_i$ Modelle von ϕ ist, ist auch $\mathfrak{B}$ ein Modell von ϕ. Um das einzusehen, schreiben wir

$$\phi = \forall\overline{x}\,\psi(\overline{x}).$$

Wenn $\overline{a} \in B$, gibt es ein A_i, in dem die $\overline{a}$ enthalten sind. Weil ϕ in $\mathfrak{A}_i$ gilt, gilt $\psi(\overline{a})$ in $\mathfrak{A}_i$. $\psi(\overline{a})$ ist aber eine Existenzaussage und gilt somit auch in $\mathfrak{B}$. Weil $\mathfrak{B} \models \phi$, kann $\mathfrak{B}$ kein Modell von T_2 sein.

$\neg$a) $\Rightarrow$ $\neg$b):
Wenn a) nicht gilt, gibt es nach dem Trennungslemma Modelle $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}^0$ von T_1 und T_2, die man nicht durch eine $\forall\exists$–Aussage trennen kann, also[1]

$$\mathfrak{B}^0 \Rightarrow_{\exists\forall} \mathfrak{A}.$$

Nach 7.3 gibt es ein

$$f : \mathfrak{B}^0 \to_{\forall} \mathfrak{A}^0$$

mit $\mathfrak{A}^0 \equiv \mathfrak{A}$. Wir können annehmen, daß $\mathfrak{B}^0 \subset \mathfrak{A}^0$ und f die Inklusionsabbildung ist. Dann ist

$$\mathfrak{A}^0_B \Rightarrow_{\exists} \mathfrak{B}^0_B.$$

Wir wenden nochmal 7.3 an und erhalten eine Oberstruktur $\mathfrak{B}^1_B$ von $\mathfrak{A}^0_B$ mit $\mathfrak{B}^1_B \equiv \mathfrak{B}^0_B$, das heißt $\mathfrak{B}^0 \prec \mathfrak{B}^1$.

$$\underbrace{\mathfrak{B}^0 \subset \mathfrak{A}^0 \subset \mathfrak{B}^1}_{\prec}$$

Jetzt wenden wir das gleiche Verfahren auf $\mathfrak{B}^1$ an und erhalten zwei Oberstrukturen $\mathfrak{A}^1 \subset \mathfrak{B}^2$ mit $\mathfrak{A}^1 \equiv \mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}^1 \prec \mathfrak{B}^2$. Schließlich ergibt sich eine unendliche Kette

$$\underbrace{\mathfrak{B}^0 \subset \mathfrak{A}^0 \subset \mathfrak{B}^1}_{\prec} \subset \underbrace{\mathfrak{A}^1 \subset \mathfrak{B}^2}_{\prec} \subset \underbrace{\cdots}_{\prec}$$

[1] $\exists\forall$–Formeln sind $\exists$–quantifizierte universelle Formeln, und äquivalent zu negierten $\forall\exists$–Formeln.

mit $\mathfrak{A}^i \equiv \mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}^i \prec \mathfrak{B}^{i+1}$. Sei nun $\mathfrak{B}$ die Vereinigung der $\mathfrak{A}^i$. Weil $\mathfrak{B}$ auch die Vereinigung der elementaren Kette $(\mathfrak{B}^i)$ ist, ist $\mathfrak{B}$ elementare Erweiterung von $\mathfrak{B}^0$ und damit ein Modell von T_2. Die $\mathfrak{A}^i$ sind aber Modelle von T_1 und wir haben einen Gegenbeispiel zu b). □

Folgerung 7.6 *T sei ein Theorie.*

1. *Sei ϕ eine Aussage. Dann sind äquivalent:*
   a) *Es gibt eine $\forall\exists$–Aussage, die modulo T zu ϕ äquivalent ist.*
   b) *Seien*
   $$\mathfrak{A}^0 \subset \mathfrak{A}^1 \subset \ldots$$
   Modelle von T und ihre Vereinigung $\mathfrak{B}$ ebenfalls ein Modell von T. Dann gilt ϕ in $\mathfrak{B}$, wenn ϕ in allen $\mathfrak{A}^i$ gilt.
2. *T ist genau dann induktiv, wenn T sich mit $\forall\exists$–Aussagen axiomatisieren läßt.*

Beweis:

1): Wir haben in 7.5 bewiesen, daß sich $\forall\exists$–Formeln auf die Vereinigung von Ketten vererben. Also gilt a) $\Rightarrow$ b). Nehmen wir umgekehrt an, daß b) gilt. Wir betrachten die Theorien

$$T_1 = T \cup \{\phi\} \quad \text{und} \quad T_2 = T \cup \{\neg\phi\}.$$

b) besagt gerade, die Vereinigung einer Kette von Modellen von T_1 kein Modell von T_2 sein kann. Nach 7.5 können wir T_1 und T_2 durch eine $\forall\exists$–Aussage ψ trennen. Aus $T_1 \vdash \psi$ folgt $T \vdash \phi \to \psi$ und aus $T_2 \vdash \neg\psi$ folgt $T \vdash \neg\phi \to \neg\psi$.

2): Daß $\forall\exists$–axiomatisierte Theorien induktiv sind, ist klar. Sei umgekehrt T induktiv und ϕ ein Axiom von T. Wenn $\mathfrak{B}$ Vereinigung von Modellen von T ist, kann $\mathfrak{B}$ kein Modell von $\neg\phi$ sein. Nach 7.5 gibt es eine universelle Aussage ψ mit $T \vdash \psi$ und $\neg\phi \vdash \neg\psi$. Alle Axiome von T folgen also aus

$$T_{\forall\exists} = \{\psi \mid T \vdash \psi,\ \psi\ \forall\exists\text{–Formel}\}.$$

□

8 Quantorenelimination

Definition Eine Theorie T hat Quantorenelimination, wenn es zu jeder L–Formel $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ eine quantorenfreie Formel $\rho(x_1, \ldots, x_n)$ gibt mit

$$T \vdash \forall x_1, \ldots, x_n \ (\ \phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \rho(x_1, \ldots, x_n) \ ).$$

Für $n = 0$ besagt das, daß modulo T jede Aussage zu einer quantorenfreien Aussage äquivalent ist. Wenn L keine Konstanten enthält, sind $\top$ und $\bot$ die einzigen quantorenfreien Aussagen. T ist dann entweder inkonsistent oder vollständig.

Definition Eine einfache Existenzformel hat die Gestalt

$$\phi = \exists y \ \rho$$

für eine quantorenfreie Formel ρ. Wenn ρ eine Konjunktion von basic Formeln ist, nennt man ϕ primitiv.

Lemma 8.1 *T hat genau Quantorenelimination, wenn jede primitive Existenzformel modulo T zu einer quantorenfreien Formel äquivalent ist.*

Beweis:

Weil jede einfache Existenzformel $\exists y \bigvee_{i<n} \rho_i$ äquivalent ist zu einer Disjunktion $\bigvee_{i<n}(\exists y \ \rho_i)$ von primitiven Existenzformeln (vgl. 2.8), können wir annehmen, daß jede einfache Existenzformel modulo T äquivalent zu einer quantorenfreien Formel ist.
Jetzt können wir Quantoren in beliebigen Formeln (in pränexer Normalform)

$$Q_1 x_1 \ldots Q_n x_n \rho$$

eliminieren. Wenn $Q_n = \exists$, wählen wir eine quantorenfreie Formel ρ_0, die modulo T zu $\exists x_n \rho$ äquivalent ist. Dann fahren wir mit der Formel $Q_1 x_1 \ldots Q_{n-1} x_{n-1} \rho_0$ fort. Sonst finden wir ein quantorenfreies ρ_1, das modulo T mit $\exists x_n \neg \rho$ äquivalent ist und fahren mit $Q_1 x_1 \ldots Q_{n-1} x_{n-1} \neg \rho_1$ fort. □

Der folgende Satz ist das modelltheoretische Kriterium für Quantorenelimination.

Satz 8.2 *Für eine Theorie T sind äquivalent:*

a) T hat Quantorenelimination.

b) Für alle Modelle $\mathfrak{M}^1$ und $\mathfrak{M}^2$ von T mit gemeinsamer Unterstruktur $\mathfrak{A}$ gilt

$$\mathfrak{M}^1_A \equiv \mathfrak{M}^2_A.$$

c) *Für alle Modelle $\mathfrak{M}^1$ und $\mathfrak{M}^2$ von T mit gemeinsamer Unterstruktur $\mathfrak{A}$ und alle primitiven Existenzformeln $\phi(x_1,\ldots,x_n)$ und Parameter $a_1,\ldots,a_n$ aus A gilt*

$$\mathfrak{M}^1 \models \phi(a_1,\ldots,a_n) \Rightarrow \mathfrak{M}^2 \models \phi(a_1,\ldots,a_n).$$

Wenn L keine Konstanten enthält, ist für $\mathfrak{A}$ ausnahmsweise die leere Struktur zugelassen.

Beweis:

a) $\Rightarrow$ b):
Sei $\phi(\overline{a})$ eine $L(A)$–Aussage, die in $\mathfrak{M}^1$ gilt. Sei $\rho(\overline{x})$ quantorenfrei und modulo T äquivalent zu $\phi(\overline{x})$. Dann ist

$$\begin{array}{lllllll} \mathfrak{M}^1 & \models & \phi(\overline{a}) & \Rightarrow & \mathfrak{M}^1 & \models & \rho(\overline{a}) \\ & & & \Rightarrow & \mathfrak{A} & \models & \rho(\overline{a}) \quad \Rightarrow \\ \mathfrak{M}^2 & \models & \rho(\overline{a}) & \Rightarrow & \mathfrak{M}^2 & \models & \phi(\overline{a}). \end{array}$$

b) $\Rightarrow$ c):
Klar.

c) $\Rightarrow$ a):
Sei $\phi(\overline{x})$ eine primitive Existenzformel. Um zu zeigen, daß $\phi(\overline{x})$ modulo T zu einer quantorenfreien $\rho(\overline{x})$ Formel äquivalent ist, erweitern wir L um ein n–Tupel $\overline{c}$ von neuen Konstanten $c_1,\ldots,c_n$. Wir müssen zeigen, daß wir $T\cup\{\phi(\overline{c})\}$ und $T\cup\{\neg\phi(\overline{c})\}$ mit einer quantorenfreien Aussage $\rho(\overline{c})$ trennen können. Wir wenden das Trennungslemma an. Seien $\mathfrak{M}^1$ und $\mathfrak{M}^2$ zwei Modelle von T mit zwei ausgezeichneten n–Tupeln $\overline{a}^1$ und $\overline{a}^2$. Nehmen wir an, daß in $(\mathfrak{M}^1,\overline{a}^1)$ und $(\mathfrak{M}^2,\overline{a}^2)$ die gleichen quantorenfreien $L(\overline{c})$–Aussagen gelten. Wir haben zu zeigen, daß

$$\mathfrak{M}^1 \models \phi(\overline{a}^1) \Rightarrow \mathfrak{M}^2 \models \phi(\overline{a}^2).$$

Sei jeweils $\mathfrak{A}^i = \langle \overline{a}^i \rangle^{\mathfrak{M}^i}$ die von den $\overline{a}^i$ erzeugten Unterstrukturen. Wenn wir zeigen können, daß es einen Isomorphismus

$$f : \mathfrak{A}^1 \to \mathfrak{A}^2$$

gibt, der $\overline{a}^1$ auf $\overline{a}^2$ abbildet, können wir (nach einer Anwendung von 1.7) annehmen, daß $\mathfrak{A}^1 = \mathfrak{A}^2 = \mathfrak{A}$ und $\overline{a}^1 = \overline{a}^2 = \overline{a}$. c) liefert dann das Gewünschte.
Jedes Element von $\mathfrak{A}^1$ hat die Form $t^{\mathfrak{M}^1}[\overline{a}^1]$ für einen L–Term $t(\overline{x})$, (2.4). Für den gesuchten Isomorphismus muß gelten:

$$f\big(t^{\mathfrak{M}^1}[\overline{a}^1]\big) = t^{\mathfrak{M}^2}[\overline{a}^2].$$

Wir verwenden also diese Gleichung als Definition. f ist sicherlich surjektiv. Zu zeigen ist aber noch die Wohldefiniertheit und Injektivität: Sei

$$s^{\mathfrak{M}^1}[\overline{a}^1] = t^{\mathfrak{M}^1}[\overline{a}^1].$$

Dann gilt $s(\overline{c}) \doteq t(\overline{c})$ in $(\mathfrak{M}^1,\overline{a}^1)$, und daher nach Voraussetzung auch in $(\mathfrak{M}^2,\overline{a}^2)$. Das bedeutet dann, daß

$$s^{\mathfrak{M}^2}[\overline{a}^2] = t^{\mathfrak{M}^2}[\overline{a}^2].$$

Wenn man in dieser Überlegung $\mathfrak{M}^1$ und $\mathfrak{M}^2$ vertauscht, erhält man die Injektivität von f.

Schließlich ist noch zu zeigen, daß f mit der Interpretation der Relationszeichen vertauscht: Daß

$$\mathfrak{M}^1 \models R\big[t_1^{\mathfrak{M}^1}[\overline{a}^1], \ldots, t_m^{\mathfrak{M}^1}[\overline{a}^1]\big],$$

ist gleichbedeutend mit $(\mathfrak{M}^1, \overline{a}^1) \models R(t_1(\overline{c}), \ldots, t_m(\overline{c}))$ und also auch mit $(\mathfrak{M}^2, \overline{a}^2) \models R(t_1(\overline{c}), \ldots, t_m(\overline{c}))$, was wiederum äquivalent ist mit

$$\mathfrak{M}^2 \models R\big[t_1^{\mathfrak{M}^2}[\overline{a}^2], \ldots, t_m^{\mathfrak{M}^2}[\overline{a}^2]\big].$$

□

Definition T ist modellvollständig, wenn für alle Modelle $\mathfrak{M}^1$ und $\mathfrak{M}^2$ von T

$$\mathfrak{M}^1 \subset \mathfrak{M}^2 \Rightarrow \mathfrak{M}^1 \prec \mathfrak{M}^2.$$

Es ist klar, daß Theorien mit Quantorenelimination modellvollständig sind[2].

Lemma 8.3 (Robinsons Test) *Sei T ein Theorie. Dann sind äquivalent:*

a) T ist modellvollständig.

b) Für alle Modelle $\mathfrak{M}^1 \subset \mathfrak{M}^2$ und jede Existenzaussage ϕ aus $L(M^1)$ ist

$$\mathfrak{M}^1 \models \phi \quad \Rightarrow \quad \mathfrak{M}^2 \models \phi.$$

c) Modulo T ist jede Formel äquivalent zu einer Allformel.

Beweis:

a)⇒b) ist trivial. a)⇔c) folgt aus 7.4.1.
Aus b) folgt, daß jede Existenzformel modulo T zu einer Allformel äquivalent ist. Wie im Beweis von 8.1 folgt daraus c). □

[2] Verwende 8.2.b) für $\mathfrak{A} = \mathfrak{M}^1$.

9 Beispiele

Die Modelle der Theorie T_∞ der unendlichen Mengen sind genau die unendlichen Mengen ohne weitere Struktur. Die Sprache $\mathrm{L}_\emptyset$ ist leer, die Axiome sind (für $n = 1, 2, \ldots$)

- $\exists x_0 \ldots x_{n-1} \bigwedge_{i<j<n} \neg x_i \doteq x_j$

Satz 9.1 *Die Theorie* T_∞ *der unendlichen Mengen hat Quantorenelimination und ist vollständig.*

Beweis:
Klar. □

Die Theorie $\mathrm{T}_{\mathrm{DLO}}$ der dichten linearen Ordnungen ohne Endpunkte hat die Axiome (in L_{O})

- $\forall x \neg x < x$
- $\forall x, y, z\ (x < y \wedge y < z \to x < z)$
- $\forall x, y\ (x < y \vee x \doteq y \vee y < x)$
- $\forall x, z\ (x < z \to \exists y\ (x < y \wedge y < z))$
- $\forall x \exists y\ x < y$
- $\forall y \exists x\ x < y$

Satz 9.2 $\mathrm{T}_{\mathrm{DLO}}$ *hat Quantorenelimination und ist vollständig.*

Beweis:
Sei A eine endliche Teilmenge der beiden Modelle O_1 und O_2. Wir wählen eine aufsteigende Aufzählung $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$. Sei $\exists y\, \rho(y)$ eine $L(A)$–Aussage, die in O_1 gilt und sei $O_1 \models \rho(b_1)$. Wir wollen die ordnungstreue Abbildung $a_i \mapsto a_i$ auf $A \cup \{b_1\}$ fortsetzen. Es gibt vier Fälle

i) $b_1 \in A$. Dann setzen wir $b_2 = b_1$.

ii) b_1 liegt zwischen a_i und a_{i+1}. Dann wählen wir b_2 in O_2 mit der gleichen Eigenschaft.

iii) b_1 ist kleiner als alle Elemente von A. Wir wählen ein ebensolches $b_2 \in O_2$.

iv) b_1 ist größer als alle a_i. Wähle b_2 ebenso.

Wenn wir b_1 auf b_2 abbilden, haben wir einen Isomorphismus $A \cup \{b_1\} \to A \cup \{b_2\}$, der zeigt, daß $O_2 \models \rho(b_2)$.

$\mathrm{T}_{\mathrm{DLO}}$ muß vollständig sein, weil die Sprache keine Konstanten enthält. □

Sei R ein (nicht notwendig kommutativer) Ring mit Einselement. Ein R–Modul

$$\mathfrak{M} = (M, 0, +, -, r)_{r \in R}$$

ist eine abelsche Gruppe $(M, 0, +, -)$ mit einer Operation $r : M \to M$ für jedes Ringelement r, die gewisse Axiome erfüllen. Die Axiome formulieren wir in der Sprache $\mathrm{L}_{\mathrm{M}(R)} = \mathrm{L}_{\mathrm{AG}} \cup \{r \mid r \in R\}$. Die Theorie $\mathrm{T}_{\mathrm{M}(R)}$ der R–Moduln besteht dann aus

- T_{AG}
- $\forall x, y\ r(x + y) \doteq rx + ry$
- $\forall x\ (r + s)x \doteq rx + sx$
- $\forall x\ (rs)x \doteq r(sx)$
- $\forall x\ 1x \doteq x$

für beliebige Ringelemente r, s. $\mathrm{T}_\infty \cup \mathrm{T}_{\mathrm{M}(R)}$ ist die Theorie der unendlichen R–Moduln.

Satz 9.3 *Sei K ein Körper. Dann hat die Theorie der unendlichen K–Moduln Quantorenelimination und ist vollständig.*

Ein K–Modul ist natürlich nichts anderes als ein Vektorraum.

Beweis:

Sei A eine endlich erzeugte Unterstruktur (also ein Untervektorraum) der beiden unendlichen K–Vektorräume V_1 und V_2 und $\exists y\, \rho(y)$ eine $L(A)$–Aussage, die in V_1 gilt. Sei b_1 ein Element von V_1, das $\rho(y)$ erfüllt. Wenn b_1 zu A gehört, sind wir fertig, weil dann $V_2 \models \rho(b_1)$. Sonst wählen wir ein $b_2 \in V_2 \setminus A$. Dabei müssen wir eventuell zu einer elementaren Erweiterung von V_2 übergehen. Die beiden Vektorräume $A + Kb_1$ und $A + Kb_2$ sind über A isomorph, unter einem Isomorphismus, der b_1 auf b_2 abbildet. Also ist $V_2 \models \rho(b_2)$.

Die Theorie ist vollständig, weil eine quantorenfreie Aussage in einem Vektorraum genau dann gilt, wenn sie im Null–Vektorraum gilt. □

Die Klasse der algebraisch abgeschlossenen Körper (vgl. Abschnitt B.4) läßt sich axiomatisieren durch die Theorie $\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}}$:

- T_{K} (Körperaxiome)
- Für jedes $n > 0$:

$$\forall x_0, \ldots x_{n-1}\ \exists y\ \ x_0 + x_1 y + \ldots + x_{n-1} y^{n-1} + y^n \doteq 0$$

Satz 9.4 (Tarski) *Die Theorie* $\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}}$ *der algebraisch abgeschlossenen Körper hat Quantorenelimination.*

Beweis:

K_1 und K_2 seien zwei algebraisch abgeschlossene Körper und R ein gemeinsamer Unterring. $\exists y\ \rho(y)$ sei eine einfache Existenzaussage mit Parametern in R, die in K_1 gilt. Wir müssen zeigen, daß $\exists y\ \rho(y)$ auch in K_2 gilt.

Zuerst gehen wir in K_1 und K_2 jeweils zu den Quotientenkörpern F_1 und F_2 von R über. Nach B.3.1 gibt es einen Isomorphismus $f : F_1 \to F_2$, der R elementweise festläßt. Dann bilden wir die relativen Abschlüsse G_i der F_i in den K_i, $(i = 1, 2)$. Nach B.4.3 setzt sich f zu einem Isomorphismus $g : G_1 \to G_2$ fort.



Sei b_1 ein Element von K_1, das $\rho(y)$ erfüllt. Es gibt zwei Fälle:

Fall 1 : $b_1 \in G_1$
Dann erfüllt $b_2 = g(b_1)$ die Formel $\rho(y)$ in K_2.

Fall 2: $b_1 \notin G_1$:
Dann ist b_1 transzendent über G_1 und die Körpererweiterung $G_1(b_1)$ ist isomorph zum rationalen Funktionenkörper $G_1(X)$. Wenn K_2 eine echte Erweiterung von G_2 ist, wählen wir für b_2 irgendein Element aus $K_2 \setminus G_2$. Dann setzt sich g zu einem Isomorphismus zwischen $G_1(b_1)$ und $G_2(b_2)$ fort, der b_1 auf b_2 abbildet. Also erfüllt auch b_2 die Formel $\rho(y)$ in K_2. Wenn $K_2 = G_2$, wählen wir eine echte elementare Erweiterung K_2' von K_2. (K_2' existiert nach 6.1.2, weil K_2 unendlich ist (B.4.4).) Dann gilt (aus dem gleichen Grund) $\exists y\ \rho(y)$ in K_2' und daher in K_2. □

Für Primzahlen p sei

$$\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}_p} = \mathrm{T}_{\mathrm{AAK}} \cup \{p \cdot 1 \doteq 0\}$$

die Theorie der algebraisch abgeschlossen Körper der Charakteristik p,

$$\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}_0} = \mathrm{T}_{\mathrm{AAK}} \cup \{\neg n \cdot 1 \doteq 0 \mid n = 1, 2, \ldots\}$$

die Theorie der algebraisch abgeschlossen Körper der Charakteristik 0.

Folgerung 9.5 *Die Theorien* $\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}_p}$ *und* $\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}_0}$ *sind vollständig.*

Beweis:

Konsistente Theorien mit Quantorenelimination, die eine *Primstruktur* haben, sind vollständig. Eine Primstruktur von T ist eine Struktur, die sich in alle Modelle von T isomorph einbetten läßt. □

Folgerung 9.6 $\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}}$ *ist modellvollständig.* □

Folgerung (Hilbertscher Nullstellensatz) *Sei K ein Körper und*

$$I \lhd K[X_1, \ldots, X_n]$$

ein Polynomideal. Dann sind äquivalent:

a) I hat eine Nullstelle im algebraischen Abschluß $\mathrm{acl}(K)$.

b) $1 \notin I$

Beweis:

Wenn $1 \notin I$, ist I in einem maximalen Ideal P enthalten (vgl. Abschnitt B.3.2). $L = K[X_1, \ldots, X_n]/P$ ist ein Erweiterungskörper, in dem die Restklassen der X_i eine Nullstelle von I bilden. Sei I erzeugt von $f_0, \ldots, f_{k-1}$ und

$$\phi = \exists x_1, \ldots x_n \bigwedge_{i<k} f_i(x_1, \ldots, x_n) \doteq 0$$

Dann gilt ϕ in L und daher in $\mathrm{acl}(L)$. Wir können annehmen, daß $\mathrm{acl}(K)$ in $\mathrm{acl}(L)$ liegt. Wegen $\mathrm{acl}(K) \prec \mathrm{acl}(L)$ gilt dann ϕ in $\mathrm{acl}(K)$. □

Die für den nächsten Satz gebrauchte Theorie der reell abgeschlossenen Körper findet man im Abschnitt B.5. Wir formulieren $\mathrm{T}_{\mathrm{RAK}}$, die Theorie der reell abgeschlossenen Körper, in der Sprache L_{AR} für angeordnete Ringe.

Satz 9.7 $\mathrm{T}_{\mathrm{RAK}}$ *hat Quantorenelimination und ist vollständig.*

Beweis:

$(K_1, <)$ und $(K_2, <)$ seien zwei reell abgeschlossene Körper und R ein gemeinsamer Unterring. $\exists y\ \rho(y)$ (für ein quantorenfreies ρ) sei eine $\mathrm{L}_{\mathrm{AR}}(R)$–Aussage, die in $(K_1, <)$ gilt. Wir müssen zeigen, daß $\exists y\ \rho(y)$ auch in $(K_2, <)$ gilt.

Zuerst gehen wir in K_1 und K_2 jeweils zu den Quotientenkörpern F_1 und F_2 von R über. Nach B.3.1 und B.5.1 gibt es einen Isomorphismus $f : (F_1, <) \to (F_2, <)$, der R elementweise festläßt. Die relativen algebraischen Abschlüsse G_i der F_i in den K_i, $(i = 1, 2)$ sind reelle Abschlüsse von der $(F_i, <)$. Nach B.5.4 setzt sich f zu einem Isomorphismus $g : (G_1, <) \to (G_2, <)$ fort.

Sei b_1 ein Element von K_1, das $\rho(y)$ erfüllt. Es gibt zwei Fälle:

Fall 1 : $b_1 \in G_1$
Dann erfüllt $b_2 = g(b_1)$ die Formel $\rho(y)$ in K_2.

Fall 2: $b_1 \notin G_1$:
Dann ist b_1 transzendent über G_1 und die Körpererweiterung $G_1(b_1)$ ist isomorph zum rationalen Funktionenkörper $G_1(X)$. Sei G_1^{l} die Menge der Elemente von G_1, die kleiner als b_1 sind, G_1^{r} die Menge der Elemente von G_1, die größer als b_1 sind. Die Elemente von $G_2^{\mathrm{l}} = g(G_1^{\mathrm{l}})$ sind kleiner als die Elemente von $G_2^{\mathrm{r}} = g(G_1^{\mathrm{r}})$. Weil Körper dicht geordnet sind, finden wir in einer elementaren Erweiterung $(K_2', <)$ von $(K_2, <)$ ein b_2, das zwischen den Elementen von G_2^{l} und den Elementen von G_2^{r} liegt. Weil b_2 nicht in G_2 liegt, ist b_2 transzendent über G_2. Also setzt sich g zu einem Isomorphismus h zwischen $G_1(b_1)$ und $G_2(b_2)$ fort, der b_1 auf b_2 abbildet.

Es bleibt noch zu zeigen, daß h ordnungstreu ist. Es genügt zu zeigen, daß h ordnungstreu auf $G_1[b_1]$ ist (B.5.1). Sei $p(b_1)$ ein Element von $G_1[b_1]$. Nach B.5.6 hat man eine Zerlegung

$$p(X) = \epsilon \prod_{i<m} (X - a_i) \prod_{j<n} \big((X - b_j)^2 + c_j\big),$$

mit positiven c_j. Ob $p(b_1)$ positiv ist, hängt nur davon ab, wieviele der Faktoren $\epsilon, b_1 - a_0, \ldots, b_1 - a_{k-1}$ negativ sind. Ob $h(p(b_1))$ positiv ist, hängt in der gleichen Weise davon ab, wieviele der Faktoren $g(\epsilon)$, $b_2 - g(a_0), \ldots, b_2 - g(a_{k-1})$ negativ sind. b_2 ist aber so gewählt, daß

$$b_1 < a_i \;\Leftrightarrow\; b_2 < g(a_i).$$

Also ist $p(b_1)$ genau dann positiv, wenn $h(p(b_1))$ positiv ist.

Schließlich haben wir

$$\begin{aligned}(K_1, <) \models \rho(b_1) \quad &\Rightarrow \quad (G_1(b_1), <) \models \rho(b_1) \quad \Rightarrow \quad (G_2(b_2), <) \models \rho(b_2) \quad \Rightarrow \\ &\Rightarrow \quad (K_2', <) \models \exists y\ \rho(y) \quad \Rightarrow \quad (K_2, <) \models \exists y\ \rho(y)\end{aligned}$$

$\mathrm{T}_{\mathrm{RAK}}$ ist vollständig, weil der angeordnete Körper der rationalen Zahlen eine Primstruktur ist. □

Folgerung (17. Hilbertsches Problem) *Sei $(K, <)$ ein reell abgeschlossener Körper. Ein Polynom $f \in K[X_1, \ldots, X_n]$ ist genau dann eine Summe von Quadraten*

$$f = g_1^2 + \ldots + g_k^2$$

von rationalen Funktionen aus $K(X_1, \ldots, X_n)$, wenn

$$f(a_1, \ldots, a_n) \geq 0$$

für alle n–tupel $a_1, \ldots, a_n$ aus K.

Beweis:

Es ist klar, daß eine Summe von Quadraten, keine negativen Werte annehmen kann. Für die Umkehrung nehmen wir an, daß p keine Summe von Quadraten ist. Dann hat $K(X_1, \ldots, X_n)$ nach B.5.3 eine Anordnung, bezüglich der

f negativ wird. Weil in K die positiven Elemente Quadrate sind, setzt diese Anordnung, die wir wieder mit $<$ bezeichnen, die Anordnung von K fort. Sei $(L,<)$ der reelle Abschluß von $\big(K(X_1,\ldots,X_n),<\big)$. Weil in $(L,<)$ die Aussage $\exists\, x_1,\ldots,x_n f(x_1,\ldots,x_n) < 0$ wahr ist, gilt sie auch in $(K,<)$. $\square$

Kapitel 4

Abzählbare Modelle

10 Der Omitting Types Satz

Definition Sei T eine L–Theorie und $\Sigma(x)$ eine Menge von L–Formeln. Eine Formel $\phi(x)$ realisiert $\Sigma(x)$ lokal, wenn

a) $\phi(x)$ mit T konsistent[1] ist,

b) $T \vdash \forall x\,(\phi(x) \to \sigma(x))$ für alle $\sigma(x)$ aus $\Sigma(x)$

T läßt $\Sigma(x)$ lokal aus, wenn $\Sigma(x)$ nicht lokal realisiert wird.

Satz 10.1 (Omitting Types) *Wenn T abzählbar[2] ist und $\Sigma(x)$ von T lokal ausgelassen wird, hat T ein Modell, das $\Sigma(x)$ ausläßt.*

Wenn $\Sigma(x)$ von $\phi(x)$ lokal realisiert wird, wird $\Sigma(x)$ in Modellen von T von allen Realisierungen von $\phi(x)$ realisiert. Wenn T vollständig ist, gilt also auch die Umkehrung des Satzes: Wenn $\Sigma(x)$ in T lokal realisiert wird, wird $\Sigma(x)$ in allen Modellen von T realisiert.

Beweis:

Wir fixieren eine abzählbare Menge C von neuen Konstanten und erweitern T zu einer Theorie T^* mit den folgenden Eigenschaften:

a) T^* ist eine Henkin–Theorie. Das heißt: für alle $L(C)$–Formeln $\psi(x)$ gibt es ein $c \in C$ mit $\exists x\,\psi(x) \to \psi(c) \;\in\; T^*$.

b) Für alle $c \in C$ gibt es ein $\sigma(x) \in \Sigma(x)$ mit $\neg\sigma(c) \in T^*$.

[1] Das heißt, daß $T \cup \{\exists x\,\phi(x)\}$ konsistent ist. Allgemeiner heißt eine Formelmenge $\Phi(x)$ konsistent mit T, wenn T ein Modell hat, in dem Φ realisiert wird.

[2] Eine L–Theorie heißt *abzählbar*, wenn L höchstens abzählbar ist.

Wir konstruieren T^* als Vereinigung einer aufsteigenden Folge

$$T = T_0 \subset T_1 \subset \ldots$$

von konsistenten Erweiterungen von T durch jeweils endlich viele Axiome. Dabei erfüllen wir schließlich alle oben aufgeführten Bedingungen.
Sei T_i schon konstruiert und sei eine der Aufgaben a) oder b) gestellt und demgemäß $\psi(x)$ oder ein c vorgegeben.

Fall a): Wenn c weder in T_i noch in $\psi(x)$ vorkommt, ist $T_{i+1} = T_i \cup \{\exists x\, \psi(x) \to \psi(c)\}$ konsistent.

Fall b): Sei T_i äquivalent zu $T \cup \{\delta(c, \overline{c})\}$. Setze $\phi(x) = \exists \bar{y}\, \delta(x, \bar{y})$. Dann ist $\phi(x)$ mit T konsistent. Wenn nun $T_i \cup \{\neg\sigma(c)\}$ inkonsistent ist, das heißt, wenn $T \vdash \delta(c, \overline{c}) \to \sigma(c)$, so folgt

$$T \vdash \forall x\, (\phi(x) \to \sigma(x)).$$

Weil $\Sigma(x)$ nicht lokal realisiert wird, gibt es also immer ein $\sigma(x) \in \Sigma(x)$, für das $T_{i+1} = T_i \cup \{\neg\sigma(c)\}$ konsistent ist.

Sei nun $(\mathfrak{A}', a_c)_{c \in C}$ ein Modell von T^*. Weil T^* eine Henkin–Theorie ist, ist $A = \{a_c \mid c \in C\}$ Universum einer elementaren Unterstruktur $\mathfrak{A}$ (siehe Hilfssatz auf Seite 23). Wegen Eigenschaft b) wird $\Sigma(x)$ von $\mathfrak{A}$ ausgelassen. □

Folgerung 10.2 (aus dem Beweis) *Sei T abzählbar und $\big(\Sigma_i(x_1, \ldots, x_{n_i})\big)$ eine höchstens abzählbare Familie von Formelmengen, die alle von T lokal ausgelassen werden. Dann gibt es ein Modell, das alle Σ_i ausläßt.*

Beweis:

Klar. □

Sei T eine Theorie. Ein n–Typ ist eine maximale Formelmenge $p(x_1, \ldots, x_n)$, die konsistent mit T ist. Wir bezeichnen mit $\mathrm{S}_n(T)$ die Menge aller n–Typen von T. Wenn T vollständig ist und $\mathfrak{A}$ irgendein Modell von T, ist

$$\mathrm{S}_n(T) = \mathrm{S}_n^{\mathfrak{A}}(\emptyset).$$

Sei $p(x_1, \ldots, x_n)$ ein n–Typ von T und $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ eine Formel. Dann sind äquivalent

a) $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ realisiert $p(x_1, \ldots, x_n)$ lokal.

b) $p(x_1, \ldots, x_n)$ ist der einzige Typ, der $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ enthält. Man sagt dazu, daß $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ *den Typ p isoliert.*.

c) $p(x_1, \ldots, x_n) = \langle \phi(x_1, \ldots, x_n) \rangle$, wobei

$$\langle \phi(\overline{x}) \rangle = \{\psi(\overline{x}) \mid T \vdash \forall \overline{x}\, (\phi(\overline{x}) \to \psi(\overline{x}))\}.$$

Typen dieser Form heißen *Haupttypen*. $\langle \phi(\overline{x}) \rangle$ ist der von ϕ erzeugte Haupttyp.

Wegen b) heißen lokal realisierte Typen auch *isolierte* Typen. Wenn $\langle\phi(\overline{x})\rangle$ ein Typ ist, heißt $\phi(\overline{x})$ *vollständig*. Man sieht leicht, daß eine Formel genau dann vollständig ist, wenn sie *atomar* ist. Das heißt, daß $\phi(\overline{x})$ konsistent mit T ist und daß für alle $\psi(\overline{x})$ entweder $\phi \wedge \psi$ oder $\phi \wedge \neg\psi$ mit T inkonsistent ist. Haupttypen heißen darum auch *atomar*.

11 $\aleph_0$–kategorische Theorien

Satz 11.1 (Ryll–Nardzewski) *Sei T eine abzählbare vollständige Theorie ohne endliches Modell. Dann ist T genau dann $\aleph_0$–kategorisch, wenn es für jedes n bis auf T–Äquivalenz nur endliche viele Formeln $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ gibt.*

Beweis:

Zum Beweis brauchen wir einen neuen Begriff.

Definition Eine L–Struktur $\mathfrak{A}$ ist $\aleph_0$–saturiert, wenn in $\mathfrak{A}$ jeder Typ über jeder endlichen Teilmenge realisiert ist.

Der Satz folgt nun aus den folgenden drei Behauptungen:

BEHAUPTUNG 1: Wenn es für jedes n nur endlich viele $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ modulo T gibt, sind alle Modelle von T $\aleph_0$–saturiert.

Beweis: Sei $\mathfrak{A}$ ein Modell von T und B eine n–elementige Teilmenge. Wenn es bis auf Äquivalenz nur N–viele Formeln in den Variablen $x_1, \ldots, x_{n+1}$ gibt, gibt es bis auf Äquivalenz in $\mathfrak{A}$ höchstens N–viele $L(B)$–Formeln $\phi(x)$. Also enthält jeder Typ $p(x) \in \mathrm{S}(B)$ eine „kleinste“ Formel $\phi_p(x)$[3]. Jedes Element von A, das $\phi_p(x)$ realisiert, realisiert auch $p(x)$.

BEHAUPTUNG 2: Wenn alle abzählbaren Modelle von T $\aleph_0$–saturiert sind, ist T $\aleph_0$–kategorisch.

Beweis: Weil T vollständig ist, sind alle Modelle von T elementar äquivalent. Wende jetzt das nächste Lemma (11.2) an.

BEHAUPTUNG 3: Wenn T $\aleph_0$–kategorisch ist, gibt es für jedes n nur endlich viele Formeln $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ modulo T.

Wenn T $\aleph_0$–kategorisch ist, kann es keine Typen geben, die in einem Modell ausgelassen werden können und (natürlich) in anderen realisiert. Wegen des Omitting Types Satzes (10.1) bedeutet das, daß alle Typen aus $S_n(T)$ atomar sind. Das bedeutet, daß es keinen Typ gibt, der

$$\Delta = \{\neg\phi(x_1, \ldots, x_n) \mid \phi(x_1, \ldots, x_n) \text{ atomar}\}$$

enthält, Δ ist also nicht konsistent mit T. Es folgt, daß T eine Disjunktion $\phi_1(x_1, \ldots, x_n) \vee \ldots \vee \phi_k(x_1, \ldots, x_n)$ von vollständigen Formeln impliziert. Es gibt dann modulo T höchstens 2^k–viele Formeln $\psi(x_1, \ldots, x_n)$, weil

$$T \vdash \forall\overline{x}\left(\psi(\overline{x}) \leftrightarrow \bigvee\{\phi_i(\overline{x}) \mid \phi_i(\overline{x}) \wedge \psi(\overline{x}) \text{ konsistent mit } T\}\right)$$

□

Lemma 11.2 *Zwei elementar äquivalente, höchstens abzählbare und $\aleph_0$–saturierte Strukturen sind isomorph.*

[3] $p(x)$ ist also atomar bezüglich $\mathrm{Th}(\mathfrak{A}_B)$.

Beweis:

$\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ seien wie im Lemma. Wie wählen Aufzählungen $A = \{a_0, a_1, \ldots\}$ und $B = \{b_0, b_1, \ldots\}$. Dann konstruieren wir eine aufsteigende Folge $f_0 \subset f_1 \subset \ldots$ von endlichen elementaren Abbildungen[4]

$$f_i : B_i \to A_i.$$

Dabei sind A_i und B_i endliche Teilmengen von A und B und f_i präserviert die Gültigkeit von Formeln:

$$\mathfrak{A} \models \phi(\overline{a}) \;\Rightarrow\; \mathfrak{B} \models \phi(f_i(\overline{a})).$$

Wir werden dafür sorgen, daß A die Vereinigung der A_i und B die Vereinigung der B_i ist. Die Vereinigung der f_i ist dann der gesuchte Isomorphismus zwischen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$.

$f_0 = \emptyset$ ist elementar, weil $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ elementar äquivalent sind. Nehmen wir an, daß f_i schon konstruiert ist. Es gibt zwei Fälle:

$i = 2n$ ist gerade
Dann versuchen wir f_i auf $A_{i+1} = A_i \cup \{a_n\}$ fortzusetzen. Dazu betrachten wir den Typ

$$p(x) = \mathrm{tp}(a_n / A_i).$$

Weil f_i elementar ist, ist (wie man leicht sieht)

$$f_i(p)(x) = \{\phi(x, f_i(\overline{a})) \mid \phi(x, \overline{a}) \in p(x)\}$$

in $\mathfrak{B}$ ein Typ über B_i. Weil $\mathfrak{B}$ $\aleph_0$–saturiert ist, gibt es eine Realisierung b'_n dieses Typs. Es ist dann für $\overline{a} \in A_i$

$$\mathfrak{A} \models \phi(a_n, \overline{a}) \;\Rightarrow\; \mathfrak{B} \models \phi(b'_n, f_i(\overline{a})).$$

Wir können also f_i durch $f_{i+1}(a_n) = b'_n$ fortsetzen.

$i = 2n + 1$ ist ungerade
Wir vertauschen rechts und links: Weil $\mathfrak{A}$ $\aleph_0$–saturiert ist, finden wir f_{i+1} mit $B_{i+1} = B_i \cup \{b_n\}$. □

Folgerung 11.3 *L sei eine höchstens abzählbare Sprache, $\mathfrak{A}$ eine L–Struktur und $a_1, \ldots, a_n$ Elemente von $\mathfrak{A}$. Dann ist* $\mathrm{Th}(\mathfrak{A})$ *genau dann $\aleph_0$–kategorisch, wenn* $\mathrm{Th}(\mathfrak{A}, a_1, \ldots, a_n)$ *$\aleph_0$–kategorisch ist.*

BEISPIELE:
Die folgenden Theorien sind $\aleph_0$–kategorisch:

T_∞ die Theorie der unendlichen Mengen

[4] Eine Abbildung f von einer Teilmenge einer Struktur $\mathfrak{A}$ in eine andere Struktur $\mathfrak{B}$ heißt elementar, wenn sie die Gültigkeit von Formeln präserviert. Dieser Begriff hängt nicht nur von f sondern auch von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ ab!

Für jeden endlichen Körper $\mathbb{F}_q$ die Theorie der unendlichen $\mathbb{F}_q$–Vektorräume

Die Theorie der $\mathrm{T}_{\mathrm{DLO}}$ der dichten linearen Ordnungen ohne Endpunkte (Satz von Cantor).

Das folgt aus 11.1, weil $\mathrm{T}_{\mathrm{DLO}}$ Quantorenelimination hat: Es gibt für jedes n nur endlich viele (sagen wir N_n) Möglichkeiten n (nicht notwendig verschiedene) Elemente anzuordnen. Für $n = 2$ zum Beispiel gibt es die drei Möglichkeiten $a_1 < a_2$, $a_1 = a_2$ und $a_2 < a_1$. Jede dieser Möglichkeiten entspricht einer vollständigen Formel $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ (bis auf Äquivalenz). Also gibt es bis auf Äquivalenz genau 2^{N_n} viele Formeln $\phi(x_1, \ldots, x_n)$.

Wir studieren das Problem der Existenz von $\aleph_0$–saturierten Strukturen:

Definition Eine Theorie T heißt schmal, wenn $S_n(T)$ für alle n höchstens abzählbar ist.

Eine abzählbare Theorie mit höchstens abzählbar vielen nicht–isomorphen höchstens abzählbaren Modellen ist zum Beispiel immer schmal. Die Umkehrung gilt nicht.

Lemma 11.4 *Eine abzählbare*[5] *konsistente Theorie hat genau dann ein höchstens abzählbares $\aleph_0$–saturiertes Modell, wenn sie schmal ist.*

Beweis:
Wenn alle Typen in einem einzigen höchstens abzählbaren Modell realisiert werden können, kann es höchstens abzählbar viele Typen geben.

Wenn umgekehrt $\mathrm{S}_{n+1}(T)$ höchstens abzählbar ist, gibt es in Modellen von T über jeder n–elementigen Menge ebenfalls höchstens abzählbar viele Typen. Wir konstruieren eine elementare Kette

$$\mathfrak{A}_0 \prec \mathfrak{A}_1 \prec \ldots$$

von Modellen von T. Für $\mathfrak{A}_0$ nehmen wir ein beliebiges höchstens abzählbares Modell. Wenn $\mathfrak{A}_i$ konstruiert ist, wählt man $\mathfrak{A}_{i+1}$ so, daß alle Typen über endlichen Teilmengen von A_i in $\mathfrak{A}_{i+1}$ realisiert werden. Nach Voraussetzung gibt es höchstens abzählbar viele solche Typen. Also kann man $\mathfrak{A}_{i+1}$ höchstens abzählbar wählen, vgl. 5.4 und 6.1.1. Die Vereinigung $\mathfrak{A} = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} \mathfrak{A}_i$ ist $\aleph_0$–saturiert, weil jeder Typ über einer endlichen Teilmenge von $\mathfrak{A}$ schon über einer endlichen Teilmenge eines A_i definiert ist, und dann in $\mathfrak{A}_{i+1}$ realisiert wird. □

Satz 11.5 (Vaught) *Eine abzählbare vollständige Theorie kann nicht genau zwei nicht–isomorphe abzählbare Modelle haben.*

[5] Die Behauptung gilt auch, wenn L überabzählbar ist.

Beweis:

Wir können annehmen, daß T schmal ist und nicht $\aleph_0$–kategorisch. Wir zeigen, daß T mindestens drei nicht–isomorphe abzählbare Modelle hat. T hat ein $\aleph_0$–saturiertes Modell $\mathfrak{A}$ und ein Modell $\mathfrak{B}$, in dem ein Typ $p(\overline{x})$ nicht realisiert wird. $p(\overline{x})$ sei in $\mathfrak{A}$ durch $\overline{a}$ realisiert. Weil $\mathrm{Th}(\mathfrak{A}, \overline{a})$ nicht $\aleph_0$–kategorisch ist, hat $\mathrm{Th}(\mathfrak{A}, \overline{a})$ ein Modell $(\mathfrak{C}, \overline{c})$, das nicht $\aleph_0$–saturiert ist. $\mathfrak{C}$ ist nicht $\aleph_0$–saturiert und daher nicht isomorph zu $\mathfrak{A}$. $\mathfrak{C}$ realisiert aber $p(\overline{x})$ und ist darum nicht isomorph zu $\mathfrak{B}$. □

Sei T eine L–Theorie und $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ eine L–Formel. Wir führen ein neues n–stelliges Relationszeichen R_ϕ ein und setzen

$$\begin{aligned} L' &= L \cup \{R_\phi\} \\ T' &= T \cup \{\forall x_1 \ldots x_n \ (R_\phi(x_1, \ldots, x_n) \leftrightarrow \phi(x_1, \ldots, x_n))\}. \end{aligned}$$

T' ist eine *definitorische* Erweiterung von T (um ein Relationszeichen). Theorien, die eine gemeinsame definitorische Erweiterung haben, nennt man definitorisch äquivalent. Man sieht leicht, daß T genau dann vollständig (oder $\aleph_0$–kategorisch) ist, wenn T' vollständig (oder $\aleph_0$–kategorisch) ist.

Wenn man für *jede* Formel ϕ ein neues Relationszeichen einführt, erhält man eine definitorische Erweiterung T^*, die offensichtlich Quantorenelimination hat[6].

Wir untersuchen im Rest dieses Abschnitts vollständige Theorien, die definitorisch äquivalent zu Theorien sind, die Quantorenelimination haben und deren Sprache endlich und *relational* ist (das heißt, keine Konstanten und Funktionszeichen enthält). Aus 11.6.1 folgt, daß solche Theorien $\aleph_0$–kategorisch sind.

Definition Eine L-Struktur $\mathfrak{A}$ ist algebraisch ω–homogen, wenn sich jeder Isomorphismus

$$f_0 : B_0 \xrightarrow{\sim} C_0$$

zwischen endlichen Unterstrukturen von $\mathfrak{A}$ auf jede endliche Oberstruktur von B_0 fortsetzen läßt. Das bedeutet, daß es zu jedem $b \in A$ ein $c \in A$ gibt, für das

$$f = f_0 \cup \{\langle b, c\rangle\}$$

ein Isomorphismus ist [7].

Wir halten für den Rest des Abschnitts eine **endliche relationale Sprache** L fest.

Lemma 11.6 *T sei eine vollständige Theorie und $\mathfrak{M}$ ein unendliches Modell von T.*

1) Wenn T Quantorenelimination hat, ist T $\aleph_0$–kategorisch.

2) T hat genau dann Quantorenelimination, wenn $\mathfrak{M}$ algebraisch ω–homogen ist.

[6] Man nennt T^* die Morleyisierung von T.

[7] Die Definition von ω–homogen findet sich auf Seite 63.

Beweis:

1): Es gibt für jedes n nur endlich viele nicht–äquivalente quantorenfreie Formeln $\rho(x_1, \ldots, x_n)$. Wenn T Quantorenelimination hat, gibt es also für jedes n nur endlich viele Formeln $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ modulo T.

2): Nehmen wir an, daß T Quantorenelimination hat. Dann ist T $\aleph_0$–kategorisch und $\mathfrak{M}$ $\aleph_0$–saturiert. Wie im Beweis von 11.2 sieht man, daß $\mathfrak{M}$ ω–homogen ist. Weil Isomorphismen zwischen Teilmengen von A elementar sind, bedeutet das, daß $\mathfrak{M}$ algebraisch ω–homogen ist.
Sei schließlich $\mathfrak{M}$ algebraisch ω–homogen. In $\mathfrak{M}$ erfüllen n–Tupel $\overline{a}$, die denselben quantorenfreien Typ

$$\mathrm{tp}_{\mathrm{qf}}(\overline{a}) = \{\rho(\overline{x}) \mid \mathfrak{M} \models \rho(\overline{a}),\ \rho(\overline{x}) \text{ quantorenfrei}\}$$

haben, dieselben einfachen Existenzformeln. Wir wollen zeigen, daß jede einfache Existenzformel $\phi(x_1, \ldots, x_n) = \exists y\, \rho(x_1, \ldots, x_n, y)$ modulo T zu einer quantorenfreien Formel äquivalent ist. Seien $r_1(\overline{x}), \ldots, r_{k-1}(\overline{x})$ die quantorenfreien Typen aller n–Tupel in $\mathfrak{M}$, die $\phi(\overline{x})$ erfüllen. Sei $\rho_i(\overline{x})$ äquivalent zur Konjunktion aller Formeln aus $r_i(\overline{x})$. Dann ist

$$T \vdash \forall \overline{x}\, \big(\phi(\overline{x}) \leftrightarrow \bigvee_{i<k} \rho_i(\overline{x})\big).$$

□

Definition Das Skelett einer L–Struktur $\mathfrak{M}$ ist die Klasse aller endlichen L–Strukturen, die isomorph zu einer Unterstruktur von $\mathfrak{M}$ sind. Die leere Struktur ist dabei zugelassen.

Bemerkung *Sei $\mathcal{K}$ das Skelett von $\mathfrak{M}$. Dann ist $\mathfrak{M}$ genau dann algebraisch ω–homogen, wenn $\mathfrak{M}$ $\mathcal{K}$–saturiert ist: Für alle $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ aus $\mathcal{K}$ und alle Einbettungen $f_0 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{M}$ und $f_1 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ gibt es eine Einbettung $g_1 : \mathfrak{B} \to \mathfrak{M}$ mit $f_0 = g_1 \circ f_1$.*

Beweis:

Seien $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, f_0 und f_1 gegeben und g_1 gesucht. Weil $\mathfrak{B}$ in $\mathcal{K}$ liegt, können wir annehmen, daß $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{M}$. Darüberhinaus können wir annehmen, daß $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$ und f_1 die Inklusionsabbildung ist. Das gesuchte g_1 ist jetzt nichts anderes als eine Fortsetzung des Isomorphismus $f_0 : \mathfrak{A} \to f_0(\mathfrak{A})$ auf $\mathfrak{B}$. □

Satz 11.7 *Höchstens abzählbare algebraisch ω–homogene Strukturen sind durch ihr Skelett bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt.*

Beweis:

$\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ seien höchstens abzählbar, algebraisch ω–homogen und mit dem gleichen Skelett. Ähnlich wie im Beweis von 11.2 konstruieren wir einen Isomorphismus zwischen $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ als Vereinigung einer aufsteigenden Folge von Isomorphismen zwischen endlichen Teilmengen von M und N. Es genügt offenbar die folgende Behauptung (und ihr Pendant mit vertauschten A und C) zu beweisen.

BEHAUPTUNG: Sei

$$f : C \xrightarrow{\sim} A$$

ein Isomorphismus zwischen einer endlichen Unterstruktur C von $\mathfrak{M}$ und einer endlichen Unterstruktur A von $\mathfrak{N}$. Dann gibt es zu jedem $c \in M$ ein $a \in N$, für das

$$f \cup \{\langle c, a\rangle\}$$

ein Isomorphismus ist.

Beweis: f und c seien gegeben. Die Struktur $B = C \cup \{c\}$ gehört zum Skelett von $\mathfrak{N}$. $f_0 : A \to \mathfrak{N}$ sei die Inklusion und $f_1 : A \to B$ die Umkehrung von f. Man findet ein $g_1 : B \to \mathfrak{N}$. Dieses g_1 ist die gesuchte Fortsetzung von f. □

Satz 11.8 *Sei $\mathcal{K}$ eine Klasse von L–Strukturen. Dann gibt es genau dann eine höchstens abzählbare, algebraisch ω–homogene L–Struktur $\mathfrak{M}$ mit dem Skelett $\mathcal{K}$, wenn*

a) $\mathcal{K}$ enthält die leere Struktur.

b) Wenn $\mathfrak{A}_0$ zu $\mathcal{K}$ gehört, gehören auch alle Elemente des Skeletts von $\mathfrak{A}_0$ zu $\mathcal{K}$.

c) (Amalgamation) *Seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}_0, \mathfrak{B}_1 \in \mathcal{K}$ und $f_i : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}_i$, $(i = 0, 1)$ isomorphe Einbettungen. Dann gibt es ein $\mathfrak{C} \in \mathcal{K}$ und zwei Einbettungen $g_i : \mathfrak{B}_i \to \mathfrak{C}$, sodaß $g_0 \circ f_0 = g_1 \circ f_1$.*



Beweis:

Wir wollen zeigen, daß das Skelett von $\mathfrak{M}$ die Amalgamationseigenschaft hat, wenn $\mathfrak{M}$ algebraisch ω–homogen ist. Dazu seien $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}_0$, $\mathfrak{B}_1$, f_0 und f_1 gegeben. Wir können annehmen, daß $\mathfrak{B}_0 \subset \mathfrak{M}$. Nach der obigen Bemerkung gibt es ein $g_1 : \mathfrak{B}_1 \to \mathfrak{M}$ mit $f_0 = g_1 \circ f_1$. Wähle für $\mathfrak{C}$ eine endliche Unterstruktur von $\mathfrak{M}$, die $\mathfrak{B}_0$ und das Bild von g_1 enthält. Schließlich nimmt man für $g_0 : \mathfrak{B}_0 \to \mathfrak{C}$ die Inklusion.

Nehmen wir umgekehrt an, daß $\mathcal{K}$ die Eigenschaften a,b,c hat. Wir wählen eine Aufzählung $(\mathfrak{B}_i)_{i\in\omega}$ aller Isomorphietypen aus $\mathcal{K}$. $\mathfrak{M}$ konstruieren wir als Vereinigung einer aufsteigenden Folge

$$\emptyset = \mathfrak{M}_0 \subset \mathfrak{M}_1 \subset \ldots$$

von Elementen von $\mathcal{K}$. Nehmen wir an, daß $\mathfrak{M}_i$ schon konstruiert ist. Wenn $i = 2n$ gerade ist, wählen wir $\mathfrak{M}_{i+1}$ als Spitze des Diagramms



wobei wir annehmen, daß g_0 die Inklusionsabbildung $\mathrm{id}_{\mathfrak{M}_i}$ ist. Wenn $i = 2n+1$ ungerade ist, geben wir uns zwei Strukturen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ aus $\mathcal{K}$ und zwei Einbettungen $f_0 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{M}_i$ und $f_1 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ vor. $\mathfrak{M}_{i+1}$ wählen wir dann mit dem Diagramm



Welche Einbettungen man sich vorgeben muß, werden wir gleich sehen. Es ist klar, daß $\mathfrak{M}$ das richtige Skelett hat. Denn die endliche Unterstrukturen von $\mathfrak{M}$ sind die Unterstrukturen der $\mathfrak{M}_i$. Weil die $\mathfrak{M}_i$ zu $\mathcal{K}$ gehören, gehören auch ihre Unterstrukturen zu $\mathcal{K}$. Andererseits ist $\mathfrak{B}_n$ jeweils isomorph zu einer Unterstruktur von $\mathfrak{M}_{2n+1}$.

Zu zeigen bleibt, daß $\mathfrak{M}$ algebraisch ω–homogen ist. Seien dazu $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ aus $\mathcal{K}$ und Einbettungen $f_0 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{M}$ und $f_1 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ gegeben. Das Bild von f_0 liegt für genügend großes j in $\mathfrak{M}_j$. Während der Konstruktion der $\mathfrak{M}_i$ achten wir darauf, daß irgendwann, für ein ungerades $i \geq j$ bei der Konstruktion von $\mathfrak{M}_{i+1}$ die Einbettungen $f_0 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{M}_i$ und $f_1 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ behandelt worden sind. (Das geht, weil es – bis auf Isomorphie – für festes j höchstens abzählbar viele Möglichkeiten gibt.) Es gibt dann eine Einbettung $g_1 : \mathfrak{B} \to \mathfrak{M}_{i+1}$ mit $f_0 = g_1 \circ f_1$. □

BEISPIEL:
Die Klasse der endlichen Graphen[8] hat offensichtlich die Amalgamationseigenschaft. Die zugehörige höchstens abzählbare algebraisch ω–homogene Struktur ist der *Randomgraph*.

[8] Ein Graph (G, R) ist eine Menge G mit einer symmetrischen, irreflexiven binären Relation.

12 Primmodelle

Wir halten in diesem Abschnitt eine abzählbare, vollständige Theorie ohne endliche Modelle fest.

Definition $\mathfrak{A}_0$ ist ein Primmodell von T, wenn $\mathfrak{A}_0$ in alle Modelle von T elementar einbettbar ist.

Weil T immer abzählbare Modelle hat, müssen Primmodelle abzählbar sein. Weil nicht–isolierte Typen in geeigneten Modelle ausgelassen werden (10.1), werden in Primmodellen nur isolierte Typen realisiert.

Definition Eine Modell $\mathfrak{A}$ von T heißt atomar, wenn alle n–Tupel $\overline{a}$ von Elementen von $\mathfrak{A}$ atomar sind. Das wiederum bedeutet, daß die Typen[9]

$$\mathrm{tp}(a_1, \ldots, a_n)$$

atomar sind.

Ein Tupel $\overline{a}$ ist genau dann atomar, wenn es eine vollständige Formel erfüllt.

Satz 12.1 *Ein Modell von T ist genau dann prim, wenn es abzählbar und atomar ist.*

Beweis:
Sei $\mathfrak{M}_0$ abzählbar und atomar und $\mathfrak{M}$ ein beliebiges Modell von T. Wir konstruieren eine elementare Einbettung von $\mathfrak{M}_0$ nach $\mathfrak{M}$ als Vereinigung einer aufsteigenden Folge von elementaren Abbildungen

$$f : A \to B$$

zwischen endlichen Teilmengen A von M_0 und B von $\mathfrak{M}$. Wir beginnen mit der leeren Abbildung, die elementar ist, weil $\mathfrak{M}_0$ und $\mathfrak{M}$ elementar äquivalent sind. Es genügt zu zeigen, daß wir jedes f fortsetzen können auf jede vorgegebene Erweiterung $A \cup \{a\}$. Wir zeigen zuerst, daß der Typ $p(x)$ von a über A atomar (bezüglich der Theorie $\mathrm{Th}((\mathfrak{M}_0)_A)$) ist. Das heißt, daß p von einer $L(A)$–Formel $\pi(x)$ erzeugt wird:

$$p(x) = \{\psi(x) \mid \psi(x)\ L(A)\text{–Formel}, \mathfrak{M}_0 \models \forall x\ (\pi(x) \to \psi(x))\}$$

Sei $\overline{a}$ ein Tupel, das die Elemente von A aufzählt und $\phi(x, \overline{x})$ eine L–Formel, die den Typ von $a\overline{a}$ erzeugt, dann wird offensichtlich $p(x)$ von $\phi(x, \overline{a})$ erzeugt.

Das Bild $f(p)$ von p unter f (vgl. S.47) ist ein über B definierter atomarer Typ, der von $\phi(x, f(\overline{a}))$ erzeugt wird. Atomare Typen lassen sich immer realisieren (nämlich durch jede Realisierung der erzeugenden Formel). Sei $b \in M$ eine Realisierung von $f(p)$. Dann ist $f \cup \{\langle a, b\rangle\}$ ein elementare Fortsetzung von f. □

[9] $\mathrm{tp}(\overline{a}) = \mathrm{tp}(\overline{a}/\emptyset)$

Satz 12.2 *Alle Primmodelle von T sind isomorph.*

Beweis:

Seien $\mathfrak{M}_0$ und $\mathfrak{M}_0'$ zwei Primmodelle. Weil Primmodelle atomar sind, können wir endliche elementare Abbildungen zwischen $\mathfrak{M}_0$ und $\mathfrak{M}_0'$ auf beliebig vorgegebene Elemente aus beiden Modellen fortsetzen. Weil $\mathfrak{M}_0$ und $\mathfrak{M}_0'$ abzählbar sind, folgt daraus (wie im Beweis von 11.2) die Isomorphie. □

Definition In T liegen die isolierten Typen dicht, wenn eine der beiden folgenden äquivalenten Bedingungen erfüllt ist:

1. Jede konsistente L–Formel $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ gehört zu einem isolierten Typ $p(x_1, \ldots, x_n) \in \mathrm{S}_n(T)$
2. Jede konsistente L–Formel $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ wird von einer vollständigen Formel $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ impliziert:

$$T \vdash \forall \overline{x}\ (\phi(\overline{x}) \to \psi(\overline{x}))$$

Satz 12.3 *T hat genau dann ein Primmodell, wenn die isolierten Typen dicht liegen.*

Beweis:

Konsistente Formeln $\psi(\overline{x})$ werden in allen Modellen realisiert. Wenn es ein atomares Modell gibt, wird $\psi(\overline{x})$ von einem atomaren Tupel $\overline{a}$ realisiert. $\psi(\overline{x})$ gehört also zum atomaren Typ $\mathrm{tp}(\bar{a})$.

$\mathfrak{M}_0$ ist genau dann atomar, wenn es für alle n die Formelmenge

$$\Sigma_n(x_1, \ldots, x_n) = \{\neg\phi(x_1, \ldots, x_n) \mid \phi(x_1, \ldots, x_n) \text{ vollständig}\}$$

ausläßt. Wenn alle Σ_n lokal ausgelassen werden, gibt es also (nach der Folgerung aus 10.1) ein abzählbares atomares Modell. Σ_n wird genau dann lokal ausgelassen, wenn es für alle konsistenten $\psi(x_1, \ldots, x_n)$ eine vollständige Formel $\phi(x_1, \ldots, x_n)$ gibt, für die $T \not\vdash \forall \overline{x}\ (\psi(\overline{x}) \to \neg\phi(\overline{x}))$. Weil $\phi(\overline{x})$ vollständig ist, bedeutet das aber $T \vdash \forall \overline{x}\ (\phi(\overline{x}) \to \psi(\overline{x}))$. Σ_n wird also genau dann lokal ausgelassen, wenn die isolierten n–Typen dicht liegen. □

BEISPIEL:
L besitzt für jedes $s \in {}^{<\omega}2$ ein einstelliges Prädikat P_s. Die Axiome von T drücken aus, daß die P_s das Universum binär zerlegen: (s durchläuft alle endlichen 0–1–Folgen)

- $\forall x\, P_\emptyset(x)$
- $\exists x\, P_s(x)$
- $\forall x\ \ ((P_{s0}(x) \vee P_{s1}(x)) \leftrightarrow P_s(x))$

- $\forall x \ \neg(P_{s0}(x) \wedge P_{s1}(x))$

T ist eine vollständige Theorie mit Quantorenelimination. Weil es keine vollständigen Formeln gibt, gibt es auch kein Primmodell.

Definition Eine Familie von Formeln $\phi_s(\overline{x})$, $\left(s \in {}^{<\omega}2\right)$ heißt binärer Baum, wenn für alle s

a) $\forall \overline{x} \ \left((\phi_{s0} \vee \phi_{s1}) \rightarrow \phi_s\right)$

b) $\forall \overline{x} \ \neg(\phi_{s0} \wedge \phi_{s1})$

Satz 12.4 *Eine schmale Theorie hat keinen binären Baum von konsistenten Formeln. Wenn T keinen binären Baum von konsistenten Formeln hat, liegen die isolierten Typen dicht.*

Tatsächlich gilt auch die Umkehrung der ersten Behauptung: Theorien ohne binäre Bäume von konsistenten Formeln sind schmal.

Beweis: (des Satzes)

Sei $\left(\phi_s(x_1, \ldots, x_n)\right)$ ein binärer Baum von konsistenten Formeln. Dann ist für jedes $\eta \in {}^{\omega}2$ die Menge

$$\left\{\phi_s(\overline{x}) \;\middle|\; s \subset \eta\right\}$$

konsistent, läßt sich also zu einem $p_\eta(\overline{x}) \in \mathrm{S}_n(T)$ erweitern. Die $p_\eta(\overline{x})$ müssen alle verschieden sein, und T ist nicht schmal.

Wenn die isolierten Typen nicht dicht liegen, gibt es eine konsistente Formel $\phi(x_1, \ldots, x_n)$, die von keiner vollständigen Formel impliziert wird. Solche Formeln nennen wir *perfekt*. Weil perfekte Formeln nicht vollständig sind, kann man sie in zwei „disjunkte“ konsistente Formeln zerlegen, die natürlich selbst wieder perfekt sind. So läßt sich ein binärer Baum aus perfekten Formeln konstruieren. □

Kapitel 5

$\aleph_1$–kategorische Theorien

13 Indiscernibles

Definition I sei eine lineare Ordnung und $\mathfrak{A}$ eine L–Struktur. Eine Familie $(a_i)_{i\in I}$ von Elementen von A heißt Folge von Indiscernibles, wenn für alle L–Formeln $\phi(x_1,\ldots,x_n)$ und alle $i_1<\ldots<i_n$ und $j_1<\ldots<j_n$ aus I

$$\mathfrak{A}\models\phi(a_{i_1},\ldots,a_{i_n})\leftrightarrow\phi(a_{j_1},\ldots,a_{j_n}).$$

Wenn zwei der a_i gleich sind, müssen alle a_i gleich sein. Man nimmt also im allgemeinen an, daß die a_i paarweise verschieden sind.

Satz 13.1 *Wenn T unendliche Modelle hat, hat T ein Modell mit einer Folge $(a_i)_{i\in I}$ von (verschiedenen) Indiscernibles. Die lineare Ordnung I läßt sich beliebig vorgeben.*

Wir brauchen aus der Kombinatorik den Satz von Ramsey. Dabei verwenden wir die Notation $[A]^n$ für die Menge aller n–elementigen Teilmengen von A.

Hilfssatz (Satz von Ramsey) *Sei A unendlich, $n\in\mathbb{N}$. $[A]^n$ sei zerlegt in die Klassen $C_1,\ldots C_k$. Dann gibt es eine unendliche Teilmenge von A, deren n–elementige Teilmengen alle in derselben Klasse liegen.*

Beweis: (von 13.1)

Wir nehmen uns eine linear geordnete Menge C von neuen Konstanten, die isomorph zu I ist. Wir betrachten die Theorie

$$T_C=T\cup\{\neg c\doteq d\mid c\neq d\in C\}\cup\big\{\phi(\overline{c})\leftrightarrow\phi(\bar{d})\;\big|\;\phi(\overline{x})\ L\text{–Formel},\ \overline{c},\bar{d}\in C\big\}.$$

Dabei durchlaufen die $\overline{c}$ und $\bar{d}$ aufsteigend geordnete Tupel aus C. Wir haben zu zeigen, daß T_C konsistent ist. Dazu sei C_0 eine endliche Teilmenge von C und Δ eine endliche Menge von L–Formeln. Es genügt zu zeigen, daß

$$T_{C_0,\Delta}=T\cup\{\neg c\doteq d\mid c\neq d\in C_0\}\cup\big\{\phi(\overline{c})\leftrightarrow\phi(\bar{d})\;\big|\;\phi(\overline{x})\in\Delta,\ \overline{c},\bar{d}\in C_0\big\}$$

konsistent ist. Wir können annehmen, daß $\phi \in \Delta$ Formeln in den freien Variablen $x_1, \ldots, x_n$ sind und daß alle Tupel $\overline{c}$ und $\overline{d}$ dieselbe Länge n haben.

Jetzt sei $\mathfrak{M}$ ein unendliches Modell von T und A eine unendliche Teilmenge von M. Wir versehen A mit einer linearen Ordnung und definieren mit

$$\overline{a} \sim \overline{b} \;\Leftrightarrow\; \mathfrak{M} \models \phi(\overline{a}) \leftrightarrow \phi(\overline{b}) \text{ für alle } \phi(x_1, \ldots, x_n) \in \Delta,$$

wobei $\overline{a}$ und $\overline{b}$ aufsteigend geordnete n–Tupel aus A, eine Äquivalenzrelation auf $[A]^n$, die höchstens $2^{|\Delta|}$ viele Klassen hat. Nach dem Satz von Ramsey gibt es eine unendliche Teilmenge B von A, deren n–elementige Mengen alle in derselben Äquivalenzklasse liegen. Wir interpretieren die $c \in C_0$ durch b_c in B, die ebenso geordnet sind wie die c. Dann ist $(\mathfrak{M}, b_c)_{c \in C_0}$ ein Modell von $T_{C_0,\Delta}$.
□

Lemma 13.2 *Wenn T abzählbar ist und das Modell $\mathfrak{M}$ von einer wohlgeordneten Folge (a_i) von Indiscernibles erzeugt wird, werden über jeder abzählbaren Teilmenge von M nur abzählbar viele Typen realisiert.*

Beweis:

Wenn $A = \{a_i \mid i \in I\}$. Dann hat jedes Element b von M die Form $b = t(\overline{a})$ für einen L–Term und ein Tupel $\overline{a}$ aus A.
S sei eine abzählbare Teilmenge von M. Wir schreiben

$$S = \{t_n^{\mathfrak{M}}(\overline{a}^n) \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Sei $A_0 = \{a_i \mid i \in I_0\}$ die (abzählbare) Menge der Elemente, die in den $\overline{a}^n$ vorkommen. Dann ist jeder Typ $\mathrm{tp}(b/S)$ bestimmt durch $\mathrm{tp}(b/A_0)$, weil jede $L(S)$–Formel

$$\phi\big(x, t_{n_1}^{\mathfrak{M}}(a^{n_1}), \ldots\big)$$

als $L(A_0)$–Formel $\phi(x, t_{n_1}(a^{n_1}), \ldots)$ aufgefaßt werden kann.

Der Typ von $b = t(\overline{a})$ über A_0 wiederum hängt nur von $t(\overline{x})$ (abzählbar viele Möglichkeiten) und dem Typ $\mathrm{tp}(\overline{a}/A_0)$ ab. Wir schreiben $\overline{a} = a_{\overline{i}}$ für ein Tupel $\overline{i}$ aus I. Weil die a_i Indiscernibles sind, hängt der Typ nur vom quantorenfreien Typ $\mathrm{tp}_{\mathrm{qf}}(\overline{i}/I_0)$ in der Struktur $(I, <)$ ab. Dieser Typ wiederum von $\mathrm{tp}_{\mathrm{qf}}(\overline{i})$ (endlich viele Möglichkeiten) und von den Typen $p(x) = \mathrm{tp}_{\mathrm{qf}}(i/I_0)$ der Elemente i von $\overline{i}$. Es gibt drei Arten solcher Typen:

1. i ist größer als alle Elemente von I_0
2. i ist ein Element i_0 von I_0
3. Für ein $i_0 \in I_0$ ist i kleiner als i_0 aber größer als alle Elemente von $\{j \mid j < i_0\}$.

Im ersten Fall liegt der Typ schon fest, in den anderen Fällen wird der Typ von i_0 bestimmt. Das ergibt für jede Komponente von $\overline{i}$ abzählbar viele Möglichkeiten.

□

Definition Sei L eine Sprache, eine Skolemtheorie $\mathrm{T}_{\mathrm{Sk}}(L)$ ist eine Theorie in einer Spracherweiterung L_{Sk} mit folgenden Eigenschaften

a) $\mathrm{T}_{\mathrm{Sk}}(L)$ hat Quantorenelimination.

b) $\mathrm{T}_{\mathrm{Sk}}(L)$ ist universell.

c) Jede L–Struktur läßt sich zu einem Modell von $\mathrm{T}_{\mathrm{Sk}}(L)$ expandieren.

d) $|L_{\mathrm{Sk}}| \leq \max\{|L|, \aleph_0\}$

Satz 13.3 *Für jedes L gibt es eine Skolemtheorie.*

Beweis:
Wir definieren eine aufsteigende Folge von Sprachen

$$L = L_0 \subset L_1 \subset L_2 \subset \ldots,$$

indem wir für jede L_i–Formel $\phi(x_1, \ldots, x_n, y)$ eine n–stellige *Skolemfunktion* f_ϕ einführen und L_{i+1} definieren als die Vereinigung von L_i und der Menge dieser Funktionszeichen. L_{Sk} ist die Vereinigung allerL_i. Wir setzen

$$\mathrm{T}_{\mathrm{Sk}} = \left\{ \forall \overline{x} \left(\exists y \, \phi(\overline{x}, y) \rightarrow \phi(\overline{x}, f_\phi(\overline{x})) \right) \;\middle|\; \phi(\overline{x}, y) \; L_{\mathrm{Sk}}\text{–Formel} \right\}.$$

□

Folgerung 13.4 *Wenn T abzählbar ist und unendliche Modelle hat, hat T in jeder Mächtigkeit ein Modell, in dem über jeder abzählbaren Teilmenge nur abzählbar viele Typen realisiert werden.*

Beweis:
Betrachte die Theorie $T^* = T \cup \mathrm{T}_{\mathrm{Sk}}(L)$. Es ist klar, daß T^* abzählbar ist, ein unendliches Modell hat und Quantorenelimination hat.

Behauptung: T^* ist universell

Beweis: Modulo $\mathrm{T}_{\mathrm{Sk}}(L)$ ist jedes Axiom ϕ von T zu einer quantorenfreien L_{Sk}–Aussage ϕ^* äquivalent. T^* ist also äquivalent zu der universellen Theorie $T \cup \{\phi^* \mid \phi \in T\}$.

Sei I eine Wohlordnung der Mächtigkeit κ und $\mathfrak{N}^*$ ein Modell von T^* mit Indiscernibles $(a_i)_{i \in I}$. Weil T^* universell ist, ist die von den a_i erzeugte Unterstruktur $\mathfrak{M}^*$ ein Modell von T^*. $\mathfrak{M}^*$ hat die Mächtigkeit κ. Weil T^* Quantorenelimination hat, ist $\mathfrak{M}^* \prec \mathfrak{N}^*$, also ist die Familie (a_i) auch indiscernible in $\mathfrak{M}^*$. Mit 13.2 schließen wir, daß in $\mathfrak{M}^*$ über jeder abzählbaren Menge nur abzählbar viele Typen realisiert sind. Das gleiche gilt dann für $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}^* \restriction L$. □

14 ω–stabile Theorien

Wir halten in diesem Abschnitt eine abzählbare, vollständige Theorie ohne endliche Modelle fest.

Definition T heißt ω–stabil, wenn für alle $\mathfrak{M} \models T$ und alle abzählbaren Teilmenge $A \subset M$ die Menge $\mathrm{S}(A)$ der Typen über S abzählbar ist.

Satz 14.1 *Wenn T in einer überabzählbaren Kardinalzahl κ kategorisch ist, ist T ω–stabil.*

Beweis:

Sei $\mathfrak{N}$ ein Modell mit einer abzählbaren Parametermenge A, über der es überabzählbar viele Typen gibt. Seien $(b_i)_{i\in I}$ $\aleph_1$–viele Elemente mit paarweise verschiedenen Typ über A. (Wir können annehmen, daß alle Typen über A in $\mathfrak{N}$ realisiert sind.) Wir wählen zuerst eine elementare Unterstruktur $\mathfrak{M}_0$, die A und die b_i enthält und die Mächtigkeit $\aleph_1$ hat. Dann wählen wir eine elementare Erweiterung $\mathfrak{M}$ von $\mathfrak{M}_0$ der Mächtigkeit κ. $\mathfrak{M}$ ist ein Modell der Mächtigkeit κ, in dem über einer abzählbaren Menge überabzählbar viele Typen realisiert sind. Nach 13.4 hat T auch ein Modell, in dem es so etwas nicht gibt. T kann also nicht κ–kategorisch sein. □

Definition T heißt total transzendent, wenn es in keinem Modell $\mathfrak{M}$ von T einen binären Baum von konsistenten $L(M)$–Formeln gibt.

Satz 14.2 *ω–stabile Theorien sind total transzendent.*

Für abzählbare Theorien gilt auch die Umkehrung (16.1).

Beweis:

Sei $\mathfrak{M}$ ein Modell mit einem binären Baum von konsistenten $L(M)$–Formeln. Sei A die Menge der in den Formeln des Baumes vorkommenden Parametern. Dann gibt es (siehe 12.4) über A überabzählbar viele Typen. □

Definition Eine Modell $\mathfrak{M}$ von T heißt Primerweiterung der Teilmenge A, wenn sich jede elementare Abbildung $A \to \mathfrak{N}$ zu einer elementaren Einbettung $\mathfrak{M} \to \mathfrak{N}$ fortsetzen läßt.



Satz 14.3 *Wenn T total transzendent ist, hat jede Teilmenge eines Modells von T eine Primerweiterung. Primerweiterungen sind atomar.*

Beweis:

Sei $\mathfrak{M}$ ein Modell von T und A eine Teilmenge von M. Wir nennen ein n–Tupel $\overline{b} \in M$ atomar über A, wenn der Typ $p(\overline{x}) = \mathrm{tp}(\overline{b}/A)$ atomar über A ist. Das heißt, daß $p(\overline{x})$ atomar in der Theorie von $\mathfrak{M}_A$ ist[1], was wiederum bedeutet, daß $p(\overline{x})$ (über A) von einer $L(A)$–Formel $\phi(\overline{x})$ erzeugt wird:

$$p(\overline{x}) = \langle \phi(\overline{x}) \rangle_A = \{\psi(\overline{x}) \mid \psi(\overline{x}) \ L(A)\text{–Formel}\ , \mathfrak{M} \models \forall \overline{x}\ (\phi(\overline{x}) \to \psi(\overline{x}))\}.$$

$\phi(\overline{x})$ heißt atomar, oder vollständig, über A.

Wir konstruieren jetzt eine elementare Unterstruktur $\mathfrak{M}_0 \prec \mathfrak{M}$, die A enthält und *konstruktibel* über A ist. Das heißt, daß für eine Ordinalzahl λ

$$M_0 = A \cup \{a_\alpha \mid \alpha < \lambda\},$$

wobei jeweils a_α atomar über

$$A_\alpha = A \cup \{a_\beta \mid \beta < \alpha\}$$

ist. Dazu nehmen wir an, daß $(a_\alpha)_{\alpha<\lambda}$ eine Konstruktion ist, die sich nicht mehr um ein Element $a_\lambda \in M \setminus A_\lambda$ verlängern läßt, und zeigen mit Tarskis Test, daß A_λ Universum einer elementaren Unterstruktur $\mathfrak{M}_0$ ist. Sei dazu $\phi(x)$ eine $L(A_\lambda)$–Formel und $\mathfrak{M} \models \exists x\, \phi(x)$. Weil die isolierten Typen über A_λ dicht liegen (14.4), gibt es einen isolierten Typ $p(x) \in \mathrm{S}(A_\lambda)$, der $\phi(x)$ enthält. Sei b eine Realisierung von $p(x)$ in $\mathfrak{M}$. Wir könnten mit $a_\lambda = b$ unsere Konstruktion fortsetzen, also ist $b \in A_\lambda$.

Konstruktible Erweiterungen sind immer prim. Denn sei $f : A \to \mathfrak{N}$ eine elementare Abbildung. Wir definieren induktiv eine aufsteigende Folge von elementaren Abbildungen $f_\alpha : A_\alpha \cup \{a_\alpha\} \to \mathfrak{N}$. Wenn die f_β für alle $\beta < \alpha$ definiert sind, ist ihre Vereinigung[2] eine elementare Abbildung $f'_\alpha : A_\alpha \to \mathfrak{N}$. Sei $p(x) = \mathrm{tp}(a_\alpha/A_\alpha)$. Weil p isoliert ist, ist $q(x) = f'_\alpha(p)$ (über dem Bild von f'_α) isoliert. Also gibt es eine Realisierung b von $q(x)$ in $\mathfrak{N}$. Wir setzen $f_\alpha = f'_\alpha \cup \{\langle a_\alpha, b\rangle\}$.
Schließlich ist die Vereinigung aller f_α $(\alpha < \lambda)$ eine elementare Einbettung $\mathfrak{M}_0 \to \mathfrak{N}$.

Konstruktible Erweiterungen sind atomar. Sei nämlich $\overline{a}$ ein Tupel von Elementen aus M_0. Wir wollen zeigen, daß $\overline{a}$ atomar über A ist. Es ist klar, daß wir annehmen können, daß die Elemente von $\overline{a}$ paarweise verschieden sind und nicht alle zu A gehören. Außerdem kommt es auf die Reihenfolge der Elemente nicht an. Also können wir annehmen, daß

$$\overline{a} = a_\alpha \overline{b}$$

für ein Tupel $\overline{b}$ aus A_α. Sei $\phi(x, \overline{c})$ eine Formel die a_α über A_α isoliert. Dann ist a_α auch atomar über $A \cup \{\overline{b}\overline{c}\}$. Wenn wir induktiv vorgehen, wissen wir, daß $\overline{b}\overline{c}$ atomar über A ist. Lemma 14.5 liefert, daß $a_\alpha \overline{b}\overline{c}$ atomar über A ist[3], woraus wiederum folgt, daß $\overline{a} = a_\alpha \overline{b}$ atomar über A ist.

[1] Synonyme: Haupttyp über A, isoliert über A.
[2] Für f'_0 nehmen wir f.
[3] Wir wenden das Lemma auf $(\mathfrak{M}_0)_A$ an.

Weil es mindestens eine konstruktible Erweiterung $\mathfrak{M}_0$ von A gibt und weil alle Primerweiterungen von A in $\mathfrak{M}_0$ stecken, sind alle Primerweiterungen atomar. □

Lemma 14.4 *Wenn T total transzendent ist, liegen über jeder Parametermenge die isolierten Typen dicht.*

Beweis:

Sei A eine Teilmenge von $\mathfrak{M}$. $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}_A)$ hat keinen binären Baum von konsistenten Formeln (in einer Variablen). Daraus folgt, daß in $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}_A)$ die isolierten 1–Typen dicht liegen (12.4). □

Lemma 14.5 *a und b seien zwei endliche Tupel von Elementen eines Modell $\mathfrak{M}$. Dann ist $\mathrm{tp}(a,b)$ genau dann atomar, wenn $\mathrm{tp}(a/b)$ und $\mathrm{tp}(b)$ atomar sind.*

Beweis:

Zuerst nehmen wir an, daß $\mathrm{tp}(a,b)$ von $\phi(x,y)$ isoliert wird.
Dann wird, erstens, $\mathrm{tp}(a/b)$ von $\phi(x,b)$ isoliert. Denn einerseits ist $\phi(x,b) \in \mathrm{tp}(a/b)$. Wenn andererseits $\rho(x,b) \in \mathrm{tp}(a/b)$, ist $\rho(x,y) \in \mathrm{tp}(a,b)$ und es folgt $\mathfrak{M} \models \forall x,y\,(\phi(x,y) \to \rho(x,y))$ und darum $\mathfrak{M} \models \forall x\,(\phi(x,b) \to \rho(x,b))$.
Zweitens wird $p(y) = \mathrm{tp}(b)$ von $\exists x\,\phi(x,y)$ isoliert. Denn einerseits ist $\exists x\,\phi(x,y) \in p(y)$. Andererseits, wenn $\sigma(y) \in p(y)$, so ist $\mathfrak{M} \models \forall x,y\,(\phi(x,y) \to \sigma(y))$, was bedeutet, daß $\mathfrak{M} \models \forall y\,(\exists x\phi(x,y) \to \sigma(y))$.

Dann sei, umgekehrt, $\mathrm{tp}(a/b)$ isoliert von $\rho(x,b)$ und $p(y) = \mathrm{tp}(b)$ isoliert von $\sigma(y)$. Dann wird $\mathrm{tp}(a,b)$ von $\rho(x,y) \wedge \sigma(y)$ isoliert. Denn einerseits ist klar, daß $\rho(x,y) \wedge \sigma(y) \in \mathrm{tp}(a,b)$. Sei andererseits $\phi(x,y) \in \mathrm{tp}(a,b)$. Dann gehört $\phi(x,b)$ zu $\mathrm{tp}(a/b)$ und es folgt $\mathfrak{M} \models \forall x\,(\rho(x,b) \to \phi(x,b))$. Also ist

$$\forall x\,(\rho(x,y) \to \phi(x,y)) \in p(y)$$

und es folgt $\mathfrak{M} \models \forall y\,(\sigma(y) \to \forall x\,(\rho(x,y) \to \phi(x,y)))$. Also $\mathfrak{M} \models \forall x,y\,(\rho(x,y) \wedge \sigma(y) \to \phi(x,y))$ □

Satz 14.6 (Lachlan) *T sei total transzendent und $\mathfrak{M}$ ein überabzählbares Modell von T. Dann hat $\mathfrak{M}$ für jedes $\kappa \geq |\mathfrak{M}|$ eine elementare Erweiterung der Mächtigkeit κ, in der jede abzählbare Formelmenge $\Sigma(\overline{x})$ von $L(M)$– Formeln ausgelassen wird, die in $\mathfrak{M}$ ausgelassen wird.*

Beweis:

Wir nennen eine $L(M)$–Formel $\phi(x)$ *überabzählbar*, wenn die Erfüllungsmenge $\phi(\mathfrak{M})$ überabzählbar ist. Weil es keinen binären Baum aus überabzählbaren Formeln gibt, gibt es eine *minimale* überabzählbare Formel $\phi_0(x)$: Für jede $L(M)$–Formel $\psi(x)$ ist entweder $\phi_0(x) \wedge \psi(x)$ oder $\phi_0(x) \wedge \neg\psi(x)$ abzählbar. Man sieht nun leicht, daß

$$p(x) = \{\psi(x) \mid \phi_0(x) \wedge \psi(x) \text{ überabzählbar}\}$$

ein Typ aus $\mathrm{S}(M)$ ist.

$p(x)$ enthält nur überabzählbare Formeln, also keine Formel der Form $x \doteq a$ für ein a aus M. $p(x)$ wird also nicht in M realisiert. Andererseits wird jede abzählbare Teilmenge $\Pi(x)$ von $p(x)$ in $\mathfrak{M}$ realisiert. Denn die $\phi_0(\mathfrak{M}) \setminus \psi(\mathfrak{M})$ sind für alle $\psi(x) \in \Pi(x)$ höchstens abzählbar. Die Elemente von $\phi_0(\mathfrak{M})$, die außerhalb der Vereinigung dieser Mengen liegen, realisieren $\Pi(x)$.

Sei a eine Realisierung von $p(x)$ in einer (echten) elementaren Erweiterung $\mathfrak{N}$. Wegen 14.3 können wir annehmen, daß $\mathfrak{N}$ atomar über $M \cup \{a\}$ ist.

Wir halten ein $b \in N$ fest. Sei $q(y) = \mathrm{tp}(b/M \cup \{a\})$ durch $\chi(a, y)$ isoliert ($\chi(x, y)$ eine $L(M)$–Formel). Wenn b eine $L(M)$–Formel $\sigma(y)$ erfüllt, ist also $\mathfrak{N} \models \forall y\, (\chi(a, y) \to \sigma(y))$. Die Formel

$$\sigma^*(x) = \forall y\, (\chi(x, y) \to \sigma(y))$$

gehört also zu $p(x)$. Wir vermerken außerdem, daß auch $\exists y\, \chi(x, y)$ zu $p(x)$ gehört.

Sei nun $\Sigma(y)$ eine abzählbare Menge von $L(M)$–Formeln, die alle auf b zutreffen. Wir wählen uns ein $a' \in M$, das alle $\sigma^*(x)$ ($\sigma \in \Sigma$) und dazu $\exists y\, \chi(x, y)$ erfüllt. Dazu gibt es dann ein $b' \in M$ mit $\mathfrak{M} \models \chi(a', b')$. Die Gültigkeit von $\sigma^*(a')$ hat zu Folge, daß $\mathfrak{M} \models \sigma(b')$. Also wird $\Sigma(y)$ von b realisiert.

Wir haben gezeigt, daß $\mathfrak{M}$ eine echte elementare Erweiterung hat, in der keine neuen abzählbaren Mengen von $L(M)$–Formeln realisiert werden. Durch Iteration erhält man beliebig lange Ketten von elementaren Erweiterungen mit der behaupteten Eigenschaft. □

15 Vaughtsche Paare

Wir halten in diesem Abschnitt eine abzählbare, vollständige Theorie ohne endliche Modelle fest.

Definition Eine L–Struktur $\mathfrak{M}$ heißt ω–homogen, wenn sich jede elementare Abbildung zwischen endlichen Teilmengen von $\mathfrak{M}$ auf jede endliche Erweiterung des Definitionsbereichs fortsetzen läßt.

$\mathfrak{M}$ ist genau dann ω–homogen, wenn für alle endlichen Teilmengen A, alle elementaren Abbildungen $f : A \to M$ und alle $p(x) \in \mathrm{S}(A)$

$$p \text{ in } \mathfrak{M} \text{ realisiert } \Rightarrow f(p) \text{ in } \mathfrak{M} \text{ realisiert .}$$

Satz 15.1 *T sei eine vollständige, abzählbare Theorie ohne endliche Modelle.*

1. *Jedes abzählbare Modell von T hat eine abzählbare, ω–homogene elementare Erweiterung.*
2. *Die Vereinigung einer elementaren Kette von ω–homogenen Modellen ist wieder ω–homogen.*
3. *Zwei ω–homogene abzählbare Modell von T sind isomorph, wenn sie dieselben n–Typen realisieren.*

Beweis:

1. Sei $\mathfrak{M}_0$ ein abzählbares Modell von T. Die abzählbar vielen Typen

$$\{f(\mathrm{tp}(a/A)) \mid A \subset M_0 \text{ endlich}, f : A \to M_0 \text{ elementar}\}$$

realisieren wir in der abzählbaren elementaren Erweiterung $\mathfrak{M}_1$. Dann wenden wir auf $\mathfrak{M}_1$ dasselbe Verfahren an, etc. Wir erhalten eine elementare Kette

$$\mathfrak{M}_0 \prec \mathfrak{M}_1 \prec \ldots,$$

deren Vereinigung offensichtlich ω–homogen ist. Man vergleiche den ähnlichen Beweis von 11.8

2. Klar

3. Wie der Beweis von 11.7. □

Für eine L–Struktur $\mathfrak{M}$ und eine $L(M)$–Formel $\phi(x)$ bezeichnen wir mit $\phi(\mathfrak{M})$ die Erfüllungsmenge $\{m \in M \mid \mathfrak{M} \models \phi(m)\}$.

Definition Zwei Modelle $\mathfrak{M} \prec \mathfrak{N}$ von T bilden ein Vaughtsches Paar für die L–Formel $\phi(x)$, wenn

a) $\mathfrak{M} \neq \mathfrak{N}$,

b) $\phi(\mathfrak{M})$ unendlich ist,

c) $\phi(\mathfrak{M}) = \phi(\mathfrak{N})$

Sei $\mathfrak{N}$ ein Modell von T, in dem $\phi(\mathfrak{N})$ unendlich ist, aber kleinere Mächtigkeit als $\mathfrak{N}$ hat. Der Satz von Löwenheim–Skolem liefert uns eine elementare Unterstruktur $\mathfrak{M}$ von $\mathfrak{N}$, die $\phi(\mathfrak{M})$ enthält und die gleiche Mächtigkeit wie $\phi(\mathfrak{M})$ hat. $\mathfrak{M} \prec \mathfrak{N}$ ist ein Vaughtsches Paar für $\phi(x)$. Der nächste Satz zeigt, daß man diese Überlegung umkehren kann.

Satz 15.2 (Vaughtscher Zwei-Kardinalzahlsatz) *Wenn T ein Vaughtsches Paar für $\phi(x)$ hat, hat T ein Modell der Mächtigkeit $\aleph_1$, in dem $\phi(\mathfrak{M})$ abzählbar ist.*

Beweis:

Sei P ein neues Prädikat. Man kann leicht eine $L(P)$–Theorie $\mathrm{T_{VP}}$ angeben, deren Modelle $(\mathfrak{N}, M)$ aus einer L–Struktur $\mathfrak{N}$ und einer Teilmenge M bestehen, die Universum einer elementaren Unterstruktur $\mathfrak{M}$ ist und zusammen mit $\mathfrak{N}$ ein Vaughtsches Paar für $\phi(x)$ bildet. Wir können daraus schließen, daß T ein abzählbares Vaughtsches Paar $\mathfrak{M}_0 \prec \mathfrak{N}_0$ (für $\phi(x)$) hat.

Jetzt konstruieren wir eine elementare Kette

$$(\mathfrak{N}_0, M_0) \prec (\mathfrak{N}_1, M_1) \prec \dots$$

von abzählbaren Vaughtschen Paaren, mit dem Ziel, daß beide Komponenten des Vereinigungspaares

$$\mathfrak{M} \prec \mathfrak{N}$$

ω–homogen sind und dieselben n–Typen realisieren. Dazu überlegt man sich, daß man zu jedem Typ $p \in \mathrm{S}^{\mathfrak{M}_i}(A)$ eine elementare Erweiterung $(\mathfrak{N}_{i+1}, M_{i+1})$ des Paars $(\mathfrak{N}_i, M_i)$ finden kann, wo p in $\mathfrak{N}_{i+1}$ realisiert wird. Wenn $A \subset M_i$, kann man p in $\mathfrak{M}_{i+1}$ realisieren. Es folgt (15.1), daß $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ isomorph sind.

Dann konstruieren wir eine stetige elementare Kette

$$\mathfrak{M}^0 \prec \mathfrak{M}^1 \prec \dots \prec \mathfrak{M}^\alpha \prec \dots \quad (\alpha < \aleph_1)$$

mit $(\mathfrak{M}^{\alpha+1}, M^\alpha) \cong (\mathfrak{N}, M)$ für alle α. Wir starten mit $\mathfrak{M}^0 = \mathfrak{M}$. Wenn $\mathfrak{M}^\alpha$ konstruiert ist, wählen wir einen Isomorphismus $\mathfrak{M} \to \mathfrak{M}^\alpha$ und setzen ihn zu einem Isomorphismus $\mathfrak{N} \to \mathfrak{M}^{\alpha+1}$ fort (siehe 1.7). Für Limeszahlen λ nehmen für $\mathfrak{M}^\lambda$ die Vereinigung der $\mathfrak{A}^\alpha$ $(\alpha < \lambda)$. $\mathfrak{M}^\lambda$ ist abzählbar, ω–homogen und erfüllt die gleichen n–Typen, wie $\mathfrak{M}$. Also ist $\mathfrak{M}^\lambda \cong \mathfrak{M}$.

Schließlich setzen wir

$$\mathfrak{M}^\lambda = \bigcup_{\alpha < \aleph_1} \mathfrak{M}^\alpha.$$

Weil die $\mathfrak{M}^\alpha$ echt wachsen, hat $\mathfrak{M}^\lambda$ die Mächtigkeit $\aleph_1$. Weil $\phi(\mathfrak{M}^\alpha) = \phi(\mathfrak{M}^0)$ für alle α, ist $\phi(\mathfrak{M}^\lambda) = \phi(\mathfrak{M}^0)$ abzählbar. □

Folgerung 15.3 *Wenn T total transzendent ist und Vaughtsches Paar für $\phi(x)$ hat, hat T für alle überabzählbaren κ ein Modell der Mächtigkeit κ, in dem $\phi(\mathfrak{M})$ abzählbar ist.*

Beweis:

Sei $\mathfrak{M}$ ein Modell der Mächtigkeit $\aleph_1$ mit abzählbaren $A = \phi(\mathfrak{M})$. Sei $\mathfrak{N}$ eine elementare Erweiterung der Mächtigkeit κ wie in 14.6. Die Formelmenge $\{\phi(x)\} \cup \{x \neq a \mid a \in A\}$ wird in $\mathfrak{M}$ und darum auch in $\mathfrak{N}$ ausgelassen. Es folgt $\phi(\mathfrak{N}) = \phi(\mathfrak{M})$. □

Definition T hat ein Vaughtsches Paar, wenn es zwei Modelle $\mathfrak{M} \prec \mathfrak{N}$ von T gibt und eine $L(M)$–Formel $\phi(x)$ mit

a) $\mathfrak{M} \neq \mathfrak{N}$,

b) $\phi(\mathfrak{M})$ unendlich ist,

c) $\phi(\mathfrak{M}) = \phi(\mathfrak{N})$

T hat genau dann ein Vaughtsches Paar, wenn es ein Modell $\mathfrak{M}$ und eine $L(M)$–Formel $\phi(x, \overline{a})$ gibt, für die $\mathrm{Th}(\mathfrak{M}, \overline{a})$ ein Vaughtsches Paar hat.

Folgerung 15.4 *Wenn T in einer überabzählbaren Mächtigkeit kategorisch ist, hat T kein Vaughtsches Paar.*

Beweis:

Wenn T in einer überabzählbaren Mächtigkeit κ kategorisch ist, ist T total transzendent (14.1). Wenn T ein Vaughtsches Paar für $\phi(x)$ hätte, gäbe es ein Modell $\mathfrak{M}$ der Mächtigkeit κ, in dem $\phi(\mathfrak{M})$ abzählbar ist. Andererseits gibt es aber immer ein Modell $\mathfrak{M}$ der Mächtigkeit κ, in dem die Erfüllungsmenge aller $L(M)$–Formeln entweder endlich ist oder ebenfalls die Mächtigkeit κ hat. Man konstruiert $\mathfrak{M}$ als Vereinigung einer stetigen elementaren Kette $(\mathfrak{M}_\alpha)_{\alpha<\kappa}$ von Modellen der Mächtigkeit κ, wobei $\mathfrak{M}_{\alpha+1}$ so gewählt ist, daß für alle $L(M_\alpha)$–Formeln $\phi(x)$ mit unendlicher Erfüllungsmenge

$$\phi(\mathfrak{M}_\alpha) \subsetneq \phi(\mathfrak{M}_{\alpha+1}).$$

T wäre also nicht κ–kategorisch. □

16 Morley abwärts

Wir werden im nächsten Kapitel zeigen, daß eine total transzendente Theorie ohne Vaughtsche Paare kategorisch in jeder überabzählbaren Mächtigkeit κ ist (18.3). Daraus folgt insbesondere, daß κ–kategorische Theorien $\aleph_1$–kategorisch sind. Wir geben hier einen separaten Beweis dafür.

Wir fixieren wieder eine abzählbare vollständige Theorie T ohne endliche Modelle.

Definition Sei κ eine unendliche Kardinalzahl. T heißt κ–stabil, wenn es in jedem Modell von T über jeder Parametermenge, die höchstens die Mächtigkeit κ hat, höchstens κ–viele Typen gibt.

$\aleph_0$-stabil ist ein Synonym für ω–stabil.

Lemma 16.1 *Wenn T total–transzendent ist, ist T κ–stabil für alle κ.*

Beweis:

Nehmen wir an, daß es über der Menge A mehr als κ–viele Typen gibt. Eine *große* Formel ist eine $L(A)$–Formel, die zu mehr all κ–vielen Typen aus $S(A)$ gehört. Unsere Annahme bedeutet, daß $x \doteq x$ groß ist. Wenn wir zeigen können, daß sich jede große Formel in zwei große Formeln zerlegen läßt, können wir einen binären Baum aus großen Formeln konstruieren und sind fertig.
Sei also ϕ groß. Weil jede kleine Formel höchstens zu κ–vielen Typen gehört, und weil es höchstens κ–viele Formeln gibt, gibt es höchstens κ–viele Typen, die kleine Formeln enthalten. ϕ gehört also zu zwei verschiedenen Typen p und q, die nur große Formeln enthalten. Wir trennen p und q durch $\psi \in p$ und $\neg\psi \in q$ und haben ϕ zerlegt in $\phi \wedge \psi$ und $\phi \wedge \neg\psi$. □

Definition Ein Modell $\mathfrak{M}$ der Mächtigkeit κ heißt saturiert, wenn in $\mathfrak{M}$ alle Typen über Parametermengen, die eine kleinere Mächtigkeit als κ haben, realisiert sind.

Lemma 16.2 *Elementar äquivalente, saturierte Strukturen von gleicher Mächtigkeit sind isomorph.*

Beweis:

$\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ seien elementar äquivalent, saturiert und beide von der Mächtigkeit κ. Wir wählen Aufzählungen[4] $(a_\alpha)_{\alpha<\kappa}$ und $(b_\alpha)_{\alpha<\kappa}$ von A und B und konstruieren eine aufsteigende Folge von elementaren Abbildungen $f : A_\alpha \to B_\alpha$. Wenn die f_β schon für alle $\beta < \alpha$ konstruiert sind, bilden wir zunächst die Vereinigung dieser f_β und nennen sie f^*_α. $f^*_\alpha : A^*_\alpha \to B^*_\alpha$ ist elementar[5]. Wir sehen aus der Konstruktion, daß A^*_α und B^*_α höchstens die Mächtigkeit $|\alpha|$, also eine kleinere

[4] Kardinalzahlen sind Ordinalzahlen. Vgl. S.80.

[5] Wenn $\alpha = 0$ ist $f^*_\alpha = \emptyset$ elementar, weil $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ elementar äquivalent sind.

Mächtigkeit als κ haben.
Wir schreiben $\alpha = \lambda + n$ (wie aus S.81) und unterscheiden zwei Fälle:

$n = 2i$.
Dann betrachten wir $p(x) = \mathrm{tp}(a_{\lambda+i}/A^*_\alpha)$. Wir realisieren $f^*_\alpha(p)$ durch $b \in N$ und setzen

$$f_\alpha = f^*_\alpha \cup \{\langle a_{\lambda+i}, b\rangle\}.$$

$n = 2i + 1$.
Wir finden in der gleichen Weise eine Fortsetzung

$$f_\alpha = f^*_\alpha \cup \{\langle a, b_{\lambda+i}\rangle\}.$$

Die Vereinigung der f_α, $(\alpha < \kappa)$, ist der gesuchte Isomorphismus zwischen $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$. □

Satz 16.3 *T ist genau dann κ–kategorisch, wenn alle Modelle der Mächtigkeit κ saturiert sind.*

Beweis:

Wenn alle Modelle der Mächtigkeit κ saturiert sind, ist wegen 16.2 T κ–kategorisch. Nehmen wir also an, daß T κ–kategorisch ist. Dann ist T total transzendent (14.1 und 14.2) und κ–stabil (16.1). Sei λ eine unendliche Kardinalzahl, kleiner als κ. Wir konstruieren eine stetige elementare Kette

$$\mathfrak{M}_0 \prec \mathfrak{M}_1 \ldots \prec \mathfrak{M}_\alpha \prec \ldots \quad (\alpha < \lambda^+),$$

aus Modellen von T, die die Mächtigkeit κ haben. Dabei realisieren wir in $\mathfrak{M}_{\alpha+1}$ alle $p \in \mathrm{S}(M_\alpha)$. Das ist möglich, weil $\mathrm{S}(M_\alpha)$ die Mächtigkeit κ hat. Schließlich sei $\mathfrak{M}$ ein Modell die Vereinigung dieser Kette. Dann ist $\mathfrak{M}$ *λ^+–saturiert* in folgendem Sinn: Jeder Typ über einer Teilmenge $A \subset M$, die eine kleinere Mächtigkeit als λ^+ hat[6], wird in $\mathfrak{M}$ realisiert. Denn wenn $a \in A$ in $M_{\alpha(a)}$ liegt, ist $\Lambda = \bigcup_{a\in A} \alpha(a)$ ein Anfangsstück von λ^+, das höchstens die Mächtigkeit λ hat. Λ hat also eine obere Schranke $\mu < \lambda^+$. Es folgt $A \subset M_\mu$. Alle Typen über A werden in $\mathfrak{M}_{\mu+1}$ realisiert. □

Folgerung 16.4 *Wenn κ–kategorisch ist, ist T auch $\aleph_1$–kategorisch.*

Die Folgerung ist die *Abwärts*–Hälfte des Satz von Morley, 18.4.

Beweis:

Wenn T nicht $\aleph_1$–kategorisch ist, gibt es ein Modell $\mathfrak{M}$, der Mächtigkeit $\aleph_1$, das nicht saturiert ist. Es gibt also einen Typ p über einer abzählbaren Teilmenge von M, der in $\mathfrak{M}$ nicht realisiert wird. Wegen 14.1 können wir annehmen, daß T total transzendent ist. Satz 14.6 liefert uns dann eine elementare Erweiterung $\mathfrak{N}$ von $\mathfrak{M}$, die die Mächtigkeit κ hat und alle abzählbaren Formelmengen ausläßt, die auch in $\mathfrak{M}$ ausgelassen werden. Insbesondere wird p nicht realisiert. $\mathfrak{N}$ ist also nicht saturiert und T kann nicht κ–kategorisch sein. □

[6] Also höchstens die Mächtigkeit λ hat.

Kapitel 6

Die Baldwin–Lachlan Theorie

Wir fixieren eine abzählbare vollständige Theorie T ohne endliche Modelle.

17 Streng minimale Theorien

Sei $\mathfrak{M}$ eine Struktur und A eine Teilmenge von M. Eine Menge der Form $\phi(\mathfrak{M})$ für eine $L(A)$–Formel $\phi(x)$ heißt A–definierbar.

Definition Sei $\mathfrak{M}$ eine Struktur und A eine Teilmenge von M. Ein Element a heißt algebraisch über A, wenn a Element einer endlichen A–definierbaren Menge ist. $\mathrm{acl}(A)$, der algebraische Abschluß von A, ist die Menge aller über A algebraischen Elemente von $\mathfrak{M}$.

In algebraisch abgeschlossenen Körpern ist $a \in \mathrm{acl}(A)$ genau dann wenn a algebraisch (im Sinne der Körpertheorie) über dem von A erzeugten Körper ist. Das liegt an der Quantorenelimination von $\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}}$.

Der algebraische Abschluß von A wird nicht größer, wenn man zu einer elementaren Erweiterung von $\mathfrak{M}$ übergeht. Denn eine $L(A)$–Formel, die in $\mathfrak{M}$ eine endliche Menge definiert[1], definiert in jeder elementaren Erweiterung die gleiche Menge. Man sieht leicht, daß $|\mathrm{acl}(A)| \leq \max\{|L|, |A|, \aleph_0\}$ (vgl. 6.1).

Wir nennen einen Typ $\mathrm{tp}(a/A)$ algebraisch, wenn a algebraisch über A ist. $p(x)$ ist genau dann algebraisch, wenn p eine algebraische Formel $\phi(x)$ enthält. Wenn man $\phi(x)$ so wählt, daß $\phi(\mathfrak{M})$ minimal ist, wird $p(x)$ von $\phi(x)$ isoliert. Die Zahl der Elemente von $\phi(\mathfrak{M})$ nennt man den Grad oder die Multiplizität $\mathrm{mult}(p)$ von p.

Lemma 17.1 *Sei $p \in \mathrm{S}(A)$ nicht algebraisch und $A \subset B$. Dann hat p eine nicht–algebraische Erweiterung $q \in \mathrm{S}(B)$.*

[1] Wir nennen eine solche Formel *algebraisch*.

Beweis:

$$q_0(x) = p(x) \cup \{\neg\psi(x) \mid \psi(x) \text{ algebraische } L(B)\text{–Formel}\}$$

ist endlich erfüllbar. Denn sonst gibt es ein $\phi(x) \in p(x)$ und algebraische $L(B)$–Formeln $\psi_1(x) \ldots \psi_n(x)$ mit

$$\mathfrak{M} \models \forall x\, (\phi(x) \to \psi_1(x) \vee \ldots \vee \psi_n(x)).$$

Dann müßte aber auch $\phi(x)$ endlich sein. Jetzt wählen wir für q einfach einen Typ, der q_0 enthält. □

Bemerkung *$p \in \mathrm{S}(A)$ ist genau dann algebraisch, wenn p in allen elementaren Erweiterungen von $\mathfrak{M}$ nur von endliche vielen (nämlich* $\mathrm{mult}(p)$ *vielen) Elementen realisiert wird.*

Beweis:

Nehmen wir an, daß $p \in \mathrm{S}(A)$ nicht algebraisch ist und daß wir schon Realisierungen $b_1, \ldots, b_n$ gefunden haben. Wir setzen p zu einem nicht–algebraischen Typ $q \in \mathrm{S}(A \cup \{b_1, \ldots, b_n\})$ fort und wählen für b_{n+1} eine Realisierung von q. b_{n+1} ist nicht algebraisch über $A \cup \{b_1, \ldots, b_n\}$, insbesondere verschieden von $b_1, \ldots, b_n$. □

Lemma 17.2 *$\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ seien elementar äquivalente Strukturen und $f : A \to B$ eine elementare Bijektion zwischen zwei Teilmengen. Dann setzt sich f zu einer elementaren Bijektion zwischen* $\mathrm{acl}(A)$ *und* $\mathrm{acl}(B)$ *fort.*

Beweis:

Sei $g : A' \to B'$ eine maximale Fortsetzung von f auf zwei Teilmengen von $\mathrm{acl}(A)$ und $\mathrm{acl}(B)$. Sei $a \in \mathrm{acl}(A)$. Weil a algebraisch über A' ist, ist a isoliert über A'. Wir können also den Typ $g(\mathrm{tp}(a/A'))$ in $\mathfrak{N}$ – durch $b \in \mathrm{acl}(A)$ – realisieren und erhalten eine Fortsetzung $g \cup \{\langle a, b\rangle\}$ von g. Es folgt $a \in A'$. g ist also auf ganz $\mathrm{acl}(A)$ definiert. Ebenso sieht man, daß g surjektiv ist. □

Definition Sei X eine Menge und $cl : \mathfrak{P}(X) \to \mathfrak{P}(X)$. cl ist ein Abschlußoperator im Sinne von van der Waerden (oder ein *Matroid*), wenn für alle $A \subset X$ und $a, b \in X$

a) $A \subset cl(A)$

b) $cl(A)$ ist die Vereinigung aller $cl(A')$, wobei A' alle endlichen Teilmengen von A durchläuft.

c) $cl(cl(A)) = cl(A)$

d) **Austauscheigenschaft**.

$$a \in cl(Ab) \setminus cl(A) \Rightarrow b \in cl(Aa)$$

Wenn X das Universum einer Struktur ist, hat acl die Eigenschaften a) (trivial), b) und c).

Definition T heißt streng minimal, wenn in allen Modellen von T alle definierbaren Teilmengen endlich oder coendlich sind.

BEISPIELE:
Die folgenden Theorien sind streng minimal.

- T_∞, die Theorie der unendlichen Mengen. In M sind über der endlichen Parametermenge A nur die Teilmengen S von A und ihre Komplemente $M \setminus S$ definierbar.
- Für einen Körper K die Theorie der unendlichen K–Vektorräume. Über der endlichen Parametermenge A sind genau die endlichen Teilmengen des von A erzeugten Unterraums und ihre Komplemente definierbar.
- Die Theorien $\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}_0}$ und $\mathrm{T}_{\mathrm{AAK}_p}$ der algebraisch abgeschlossenen Körper fester Charakteristik. Definierbare Mengen sind boolesche Kombinationen von Nullstellenmengen $\{a \in K \mid p(a) = 0\}$ von Polynomen $p(X) \in K[X]$. Nullstellenmengen sind entweder endlich oder, wenn $p = 0$, gleich K.

Bemerkung *T ist genau dann streng minimal, wenn es über jeder Parametermenge genau einen nicht–algebraischen Typ gibt.*

Beweis: Der Beweis von Lemma 17.1 zeigt auch, daß sich jede nicht–algebraische $L(A)$–Formel zu einem nicht–algebraischen Typ $q \in \mathrm{S}(A)$ fortsetzen läßt. Daraus folgt leicht die Behauptung. □

Wenn T streng minimal ist, ist

$$|\mathrm{S}(A)| = |\mathrm{acl}(A)| + 1.$$

Streng minimale Theorien sind also λ–stabil für alle λ und total transzendent. Wenn $\phi(\mathfrak{M})$ koendlich ist und $\mathfrak{N}$ eine echte elementare Erweiterung von $\mathfrak{M}$, ist auch $\phi(\mathfrak{N})$ eine echte Erweiterung von $\phi(\mathfrak{M})$. Streng minimale Theorien können also keinen Vaughtschen Paare haben.

Lemma 17.3 *In Modellen einer streng minimalen Theorie definiert der algebraische Abschluß eine Matroidstruktur.*

Beweis:

Sei a nicht algebraisch über b und b nicht algebraisch über $\emptyset$. Wegen der obigen Bemerkung haben alle derartigen Paare ab denselben Typ $p(x, y)$. Sei B ein unendliche Menge von nicht–algebraischen Elementen und a' nicht–algebraisch über B. Weil alle $b' \in B$ denselben Typ $p(a', y)$ über a' haben, ist kein b' algebraisch über a'. Also ist auch b nicht algebraisch über a. □

Definition Sei (X, cl) ein Matroid. A von X ist

1. unabhängig, wenn $a \notin \mathrm{acl}(A \setminus \{a\})$ für alle $a \in A$.
2. ein Erzeugendensystem, wenn $X = \mathrm{acl}(A)$.
3. Basis, wenn A ein Erzeugendensystem ist.

Bemerkung *Sei M ein Modell einer streng minimalen Theorie. Bijektionen zwischen unabhängigen Teilmengen von M sind elementar.*

Beweis:

Wenn $u_1, \ldots, u_n$ unabhängig sind, ist $\mathrm{tp}(u_1)$ der (einzige) nicht–algebraische Typ über $\emptyset$. $\mathrm{tp}(u_2/u_1)$ ist der nicht–algebraische Typ über b_1 und so fort. Schließlich ist $\mathrm{tp}(b_n/b_1 \ldots b_{n-1})$ der nicht–algebraische Typ über $b_1 \ldots b_{n-1}$. Dadurch ist $\mathrm{tp}(u_1, \ldots, u_n)$ eindeutig bestimmt. □

Lemma 17.4 *Ein unabhängige Teilmenge eines Erzeugendensystems läßt sich zu einer Basis erweitern.*

Sei U eine unabhängige Teilmenge des Erzeugendensystems E. B sei ein maximale unabhängige Teilmenge von E, die U enthält. Wir zeigen, daß B eine Basis ist. Dazu sei e ein beliebiges Element von E, daß nicht zu $\mathrm{acl}(B)$ gehört. Sei $b \in B$ beliebig. Dann ist $b \notin \mathrm{acl}(B \setminus \{b\})$, woraus mit der Austauscheigenschaft folgt, daß $b \notin \mathrm{acl}(B \setminus \{b\} \cup \{e\})$. Also ist $B \cup \{e\}$ unabhängig, was der Maximalität von B widerspricht. Wir haben also $E \subset \mathrm{acl}(B)$ und B ist ein Erzeugendensystem.

Satz 17.5 *Streng minimale Theorien sind kategorisch in allen überabzählbaren Mächtigkeiten.*

Beweis:

Sei κ überabzählbar und $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ zwei Modelle der Mächtigkeit κ. Wir wählen zwei Basen B_1 und B_2 von $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$. Weil κ überabzählbar ist, haben B_1 und B_2 die Mächtigkeit κ. Sei $f : B_1 \to B_2$ eine Bijektion. f ist eine elementare Abbildung, die sich zu einem Isomorphismus der algebraischen Abschlüsse M_1 und M_2 fortsetzt (17.2). □

Definition Sei (X, cl) ein Matroid und S eine Teilmenge. Man kann cl

1. auf S einschränken:

$$cl^S(A) = cl(A) \cap S, \quad (A \subset S).$$

(S, cl^S) ist wieder ein Matroid.

2. nach S relativieren:

$$cl_S(A) = cl(A \cup S)$$

(X, cl_S) ist wieder ein Matroid.

Bemerkung *Sei A eine Basis von (S, cl^S) und B eine Basis von (X, cl_S). Dann ist die (disjunkte) Vereinigung $A \cup B$ eine Basis von (X, cl).*

Beweis:

Daß $A \cup B$ ein Erzeugendensystem ist, ist klar. Weil B unabhängig über S ist, ist $b \notin cl_S(B \setminus \{b\}) = cl(A \cup B \setminus \{b\})$ für alle $b \in B$. Sei $a \in A$ und $A' = A \setminus \{a\}$. Wir müssen zeigen, daß $a \notin cl(A' \cup B)$. Wenn nicht, gäbe es eine Teilmenge B' von B und ein $b \in B$ mit $a \in cl(A' \cup B' \cup \{b\})$ und $a \notin cl(A' \cup B')$, denn $a \notin cl(A')$. Daraus würde $b \in cl(A \cup B')$ folgen. □

A nennt man eine Basis *von* S und B eine Basis *über* oder *relativ zu* S.

Lemma 17.6 *Alle Basen eines Matroids haben dieselbe Mächtigkeit.*

Beweis:

Seien A und B zwei Basen von X. Zuerst wählen wir für jedes $a \in A$ eine (minimale) endliche Teilmenge B_a von B mit $a \in cl(B_a)$. Weil die Vereinigung der B_a ein Erzeugendensystem ist, ist $B = \bigcup_{a \in A} B_a$. Symmetrischerweise ist $A = \bigcup_{b \in B} A_b$. Daraus folgt, daß A genau dann endlich ist, wenn A endlich ist und daß $|A| = |B|$, wenn A und B unendlich sind.

Nehmen wir also an, daß A und B endlich sind. Wir beweisen die Behauptung durch Induktion über $|A|$. Wenn A leer ist, muß auch B leer sein. Wenn $A \neq \emptyset$ wählen wir ein $a \in A$. Setze $S = cl(B_a)$. Weil B_a nicht leer sein kann, können wir uns ein $b \in B_a$ wählen. Setze $B' = B_a \setminus \{b\}$.

Weil B_a minimal gewählt war, ist $a \notin cl(B')$ und daher $b \in cl(B' \cup \{a\})$. Daraus folgt (wie in der obigen Bemerkung), daß $B' \cup \{a\}$ eine Basis von S ist. Weil $B \setminus B_a$ eine Basis relativ zu S ist, ist $(B' \cup \{a\}) \cup (B \setminus B_a)$ eine Basis von X. Es folgt, daß $A \setminus \{a\}$ und $B \setminus \{b\}$ zwei Basen relativ zu $\{a\}$ sind. Aus der Induktionsvoraussetzung, angewendet auf $cl_{\{a\}}$, folgt, daß $|A \setminus \{a\}| = |B \setminus \{b\}|$. Also ist $|A| = |B|$. □

Definition Die Dimension $\dim(X)$ eines Matroids (X, cl) ist die Mächtigkeit einer Basis. Für eine Teilmenge S von X ist $\dim(S)$ die Dimension von (S, cl^S) und $\dim_S(X)$ die Dimension von (X, cl_S).

Aus der letzten Bemerkung folgt, daß

$$\dim(X) = \dim(S) + \dim_S(X).$$

Die Dimension $\dim(\mathfrak{M})$ eines Modells $\mathfrak{M}$ einer streng minimalen Theorie ist die Dimension des Matroids (M, acl).

Satz 17.7 *Sei T streng minimal. Modelle von T sind durch ihre Dimension eindeutig bestimmt. Die Menge der vorkommenden Dimensionen ist ein Endabschnitt der Kardinalzahlen. $\mathfrak{M}$ ist ω–saturiert genau dann, wenn* $\dim(\mathfrak{M}) \geq \aleph_0$. *Alle Modelle sind ω–homogen.*

Beweis:

Daß $\mathfrak{M}$ durch $\dim(\mathfrak{M})$ eindeutig bestimmt ist, zeigt der Beweis von 17.5.

Der gleiche Beweis zeigt auch, daß man in jedes Modell $\mathfrak{M}$ jedes Modell von kleinerer Dimension elementar einbetten kann. Wir zeigen, daß jede unendliche algebraisch abgeschlossene Teilmenge S von M Universum einer elementaren Unterstruktur ist. Daraus folgt, daß die vorkommenden Dimensionen die Dimensionen der unendlichen algebraisch abgeschlossenen Teilmengen sind, also ein Endabschnitt der Klasse aller Kardinalzahlen. Wir müssen zeigen, daß jede erfüllbare $L(S)$–Formel $\phi(x)$ in S realisiert werden kann (4.2). Wenn $\phi(\mathfrak{M})$ endlich ist, sind alle Realisierungen algebraisch über S und liegen daher in S selbst. Wenn $\phi(\mathfrak{M})$ koendlich ist, schneidet $\phi(\mathfrak{M})$ alle unendlichen Mengen.

Sei A eine endliche Teilmenge von $\mathfrak{M}$ und p der nicht algebraische Typ in $\mathrm{S}(A)$. Wenn p in $\mathfrak{M}$ realisiert wird, werden alle Typen über A realisiert. p wird in $\mathfrak{M}$ genau dann realisiert, wenn $M \neq \mathrm{acl}(A)$, das heißt, wenn $\dim(\mathfrak{M}) > \dim(A)$. Daraus folgt, daß $\mathfrak{M}$ genau dann ω–saturiert ist, wenn $\mathfrak{M}$ unendliche Dimension hat.

Es bleibt noch zu zeigen, daß alle Modelle ω–homogen sind. Sei $f : A \to B$ eine elementare Bijektion zwischen zwei endlichen Teilmengen von M. Sei p der nicht–algebraische Typ über A. Dann ist $f(p)$ der nicht–algebraische Typ über B. p wird genau dann in $\mathfrak{M}$ realisiert, wenn $\dim(\mathfrak{M}) > \dim(A)$ und $f(p)$ wird genau dann realisiert, wenn $\dim(\mathfrak{M}) > \dim(B)$. Weil $\dim(A) = \dim(B)$, wird p genau dann realisiert, wenn $f(p)$ realisiert wird. □

18 Der Satz von Baldwin–Lachlan

Sei T eine abzählbare vollständige Theorie ohne endliche Modelle. Wir wollen in diesem Abschnitt zeigen, daß T in allen überabzählbaren Kardinalzahlen kategorisch ist, wenn T total transzendent ist und kein Vaughtsches Paar hat.

Lemma 18.1 *Wenn T kein Vaughtsches Paar hat, gibt es zu jeder L–Formel $\phi(x, \overline{y})$ eine Schranke F, sodaß in Modellen $\mathfrak{M}$ von T und für alle Parameter $\overline{a} \in M$,*

$$\phi(\mathfrak{M}, \overline{a})$$

entweder unendlich ist oder höchstens F Elemente enthält.

Die im Lemma behauptete Eigenschaft von T bedeutet, daß der Quantor $\exists^\infty x$, *es gibt unendliche viele x*, eliminierbar ist. Das heißt, daß es für alle $\phi(x, \overline{y})$ ein $\psi(\overline{y})$ gibt, sodaß in allen Modellen $\mathfrak{M}$ von T und alle $\overline{a} \in M$

$$\mathfrak{M} \models \exists^\infty x\, \phi(x, \overline{a}) \Longleftrightarrow \mathfrak{M} \models \psi(\overline{a}).$$

Oder auch

$$T \vdash \forall \overline{y} \big(\exists^\infty x\, \phi(x, \overline{y}) \leftrightarrow \psi(\overline{y}) \big).$$

Wenn F existiert, können wir nämlich $\psi(\overline{y}) = \exists^{>F} x\, \phi(x, \overline{y})$ setzen. Wenn umgekehrt $\psi(\overline{y})$ eine Formel ist, die aus $\exists^\infty x\, \phi(x, \overline{y})$ folgt, zeigt ein Kompaktheitsargument, daß es ein F geben muß, sodaß schon

$$T \vdash \exists^{>F} x\, \phi(x, \overline{y}) \to \psi(\overline{y}).$$

Beweis:

Sei P ein neues unäres Prädikat und $c_1, \ldots, c_n$ neue Konstanten. T^* sei die Theorie aller $L \cup \{P, c_1, \ldots, c_n\}$–Strukturen

$$(\mathfrak{M}, N, a_1, \ldots, a_n),$$

wobei $\mathfrak{M}$ ein Modell von T ist, N Universum einer echten elementaren Unterstruktur, $a_1, \ldots, a_n$ Elemente von N und $\phi(\mathfrak{M}, \overline{a}) \subset N$. Nehmen wir an, die Schranke F würde es nicht geben. Dann gibt es für jedes F ein Modell $\mathfrak{N}$ und $\overline{a} \in N$, sodaß $\phi(\mathfrak{N}, \overline{a})$ endlich ist, aber mehr als F Elemente hat. Sei $\mathfrak{M}$ eine echte elementare Erweiterung von $\mathfrak{N}$. Dann ist $\phi(\mathfrak{M}, \overline{a}) = \phi(\mathfrak{N}, \overline{a})$. Das Paar $(\mathfrak{M}, N, \overline{a})$ ist also ein Modell von T^*. Diese Überlegung zeigt, daß die Theorie

$$T^* \cup \{\exists^{>F} x\, \phi(x, \overline{c}) \mid F = 1, 2, \ldots\}$$

endlich erfüllbar ist. Ein Modell dieser Theorie liefert ein Vaughtsches Paar von T. □

Definition Sein $\mathfrak{M}$ ein Modell von T und $\mu(x)$ eine $L(M)$–Formel. $\mu(x)$ heißt minimal in $\mathfrak{M}$, wenn für alle $L(M)$–Formeln $\phi(x)$ der Durchschnitt $\mu(\mathfrak{M}) \wedge \phi(\mathfrak{M})$ entweder endlich oder koendlich in $\mu(\mathfrak{M})$ ist.
$\mu(x)$ ist streng minimal, wenn μ minimal in allen elementaren Erweiterungen von $\mathfrak{M}$ ist.

Ob $\mu(x, a_1, \ldots, a_m)$ streng minimal ist, hängt nur vom Typ des Parametertupels $\overline{a}$ ab und nicht dem aktuellen Modell. Daß $\mu(x, \overline{a})$ streng minimal ist, bedeutet nämlich, daß für alle L–Formeln $\phi(x, \overline{z})$ die Formelmenge

$$\Sigma_\phi(\overline{z}, \overline{a}) = \left\{ \exists^{>F} x(\mu(x, \overline{a}) \wedge \phi(x, \overline{z})) \wedge \exists^{>F} x(\mu(x, \overline{a}) \wedge \neg\phi(x, \overline{z})) \;\middle|\; F = 1, 2, \ldots \right\}$$

in keiner elementaren Erweiterung realisiert werden kann. Das bedeutet, daß es für alle $\phi(x, \overline{z})$ eine Schranke F gibt, sodaß

$$M \models \forall \overline{z} \left(\exists^{\leq F} x(\mu(x, \overline{a}) \wedge \phi(x, \overline{z})) \vee \exists^{\leq F} x(\mu(x, \overline{a}) \wedge \neg\phi(x, \overline{z})) \right).$$

Das ist eine elementare Eigenschaft von $\overline{a}$.

Sei $\mu(x)$ eine streng minimale Formel ohne Parameter. Man zeigt wie in 17.3, daß $\mu(\mathfrak{M})$ mit dem Abschlußoperator

$$cl(A) = \mathrm{acl}(A) \cap \mu(\mathfrak{M})$$

ein Matroid ist[2]. Ebenso zeigt man, daß es über jeder Parametermenge genau einen nicht–algebraischen Typ p mit $\mu(x) \in p$ gibt (vgl. S.70). Daraus folgt, daß der Typ $\mathrm{tp}(b_1, \ldots, b_n)$ einer unabhängigen Folge von Elementen von $\mu(\mathfrak{M})$ eindeutig bestimmt ist. (Vergleiche die Bemerkung auf Seite 71.)

Lemma 18.2

1. *Wenn T total transzendent ist, gibt es in jedem Modell $\mathfrak{M}$ eine minimale $L(M)$–Formel.*
2. *Wenn $\mu(x)$ minimal in M ist und wenn M ω–saturiert ist, ist $\mu(x)$ streng minimal.*
3. *Wenn T den Quantor $\exists^\infty$ eliminiert, ist jede in einem Modell minimale Formel auch streng minimal.*

Beweis:

1) Wenn es in $\mathfrak{M}$ keine minimale Formel gibt, läßt sich jede $L(M)$–Formel mit unendlicher Erfüllungsmenge (eine unendliche Formel) aufspalten in zwei unendliche Formeln. Es gibt also einen binären Baum aus unendlichen Formeln und T ist nicht total transzendent.

2) Wenn $\mu(x, \overline{a})$ minimal in $\mathfrak{M}$ ist, sind die Formelmengen $\Sigma_\phi(\overline{z}, \overline{a})$ (75) in $\mathfrak{M}$ nicht erfüllbar. Wenn $\mathfrak{M}$ ω–saturiert sind, müssen die $\Sigma_\phi(\overline{z}, \overline{a})$ inkonsistent sein und $\mu(x, \overline{a})$ ist streng minimal.

3) Wenn sich der Quantor $\exists^\infty$ eliminieren läßt, ist jede der Formelmengen $\Sigma_\phi(\overline{z}, \overline{a})$ äquivalent zu einer endlichen Teilmenge. □

Satz 18.3 *Wenn T total transzendent ist und keine Vaughtschen Paare hat, ist T in allen überabzählbaren Kardinalzahlen kategorisch.*

[2] Man beachte, daß Minimalität nicht ausreicht.

Beweis:

Wenn T total transzendent ist gibt es ein Primmodell $\mathfrak{M}_0$. (Das folgt aus 12.3 und 12.4 oder aus 14.3.) Sei $\mu(x, \overline{a}_0)$ minimal in $\mathfrak{M}_0$. Weil T keine Vaughtschen Paare hat, ist der Quantor $\exists^\infty$ eliminierbar ist und $\mu(x, \overline{a}_0)$ ist streng minimal. Weil $\mathfrak{M}_0$ prim ist, ist $\overline{a}_0$ atomar (vgl 12.1).

Sei $q(\overline{y})$ der Typ von $\overline{a}_0$. Die $L(\overline{c})$–Theorie

$$T(q) = \mathrm{Th}(\mathfrak{M}, \overline{a}_0) = T \cup \{\phi(\overline{c}) \mid \phi(\overline{y}) \in q(y)\}$$

ist vollständig. Weil q isoliert ist, läßt sich jedes Modell $\mathfrak{M}$ von T zu einem Modell $(\mathfrak{M}, \overline{a})$ von $T(q)$ erweitern. Es genügt also zu zeigen, daß $T(q)$ in allen überabzählbaren Kardinalzahlen kategorisch ist. Natürlich ist auch $T(q)$ total transzendent und hat kein Vaughtsches Paar. Die $L(\overline{c})$–Formel $\mu(x, \overline{c})$ ist immer noch streng minimal, enthält aber jetzt keine neuen Parameter mehr. Darum haben wir $T(q)$ eingeführt: Wir können annehmen, daß es für T ein streng minimale Formel μ ohne Parameter gibt[3].

Sei $\mathfrak{M}$ ein Modell von T. Und $\mathfrak{M}' \prec \mathfrak{M}$ eine Primerweiterung von $\mu(\mathfrak{M})$ (vgl. 14.3). Weil T kein Vaughtsches Paar hat, muß $\mathfrak{M}' = \mathfrak{M}$ sein. Es folgt, daß $\mathfrak{M}$ *minimale* Primerweiterung von $\mu(\mathfrak{M})$ ist: $\mathfrak{M}$ hat keine echte elementare Unterstruktur, die $\mu(\mathfrak{M})$ enthält. Der Satz von Löwenheim–Skolem liefert $|\mathfrak{M}| = |\mu(\mathfrak{M})|$. Wenn $\mathfrak{M}$ überabzählbar ist, folgt $\dim(\mu(\mathfrak{M})) = |\mathfrak{M}|$.

Seien nun $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ zwei Modelle der gleichen überabzählbaren Mächtigkeit. Wir wählen zwei Basen B_1 und B_2 von $\mu(\mathfrak{M}_1)$ und $\mu(\mathfrak{M}_2)$ und eine Bijektion $f : B_1 \to B_2$. f ist eine elementare Abbildung, die sich zu einem Isomorphismus der algebraischen Abschlüsse fortsetzen. Wir erhalten also eine elementare Bijektion

$$g : \mu(\mathfrak{M}_1) \to \mu(\mathfrak{M}_2).$$

Weil $\mathfrak{M}_1$ Primerweiterung von $\mu(\mathfrak{M}_1)$ ist, läßt sich g zu einer elementaren Einbettung $h : \mathfrak{M}_1 \to \mathfrak{M}_2$ fortsetzen. Weil $\mathfrak{M}_2$ eine minimale Erweiterung von $\mu(\mathfrak{M}_2)$ ist, ist h surjektiv und also ein Isomorphismus. □

Folgerung 18.4 (Morley) *Sei T eine abzählbare Theorie. Wenn T in einer überabzählbaren Mächtigkeit kategorisch ist, ist T in allen überabzählbaren Mächtigkeiten kategorisch.*

Beweis:

(Natürlich können wir annehmen, daß T vollständig ist und keine endlichen Modelle hat.) Wenn T in einer überabzählbaren Mächtigkeit kategorisch ist, ist T total transzendent (14.1) und hat keine Vaughtschen Paare (15.4). □

[3] Ohne diese Annahme wäre das Schriftbild etwas komplizierter.

Anhang A

Mengenlehre

1 Kardinalzahlen

Zwei Mengen, zwischen denen es eine Bijektion gibt, heißen gleichmächtig. Man kann jeder Menge x eine *Kardinalzahl* $|x|$ (die *Mächtigkeit* von x) so zuordnen, daß je zwei Mengen genau dann die gleiche Mächtigkeit haben, wenn sie gleichmächtig sind[1].

Man bezeichnet mit 0 die Mächtigkeit der leeren Menge, mit 1 die Mächtigkeit einer ein–elementigen Menge etc.

Definition Für zwei Kardinalzahlen κ und λ definieren wir

$$\kappa \leq \lambda,$$

wenn λ die Mächtigkeit einer Menge x ist und κ die Mächtigkeit einer Teilmenge von x.

Man sieht leicht, daß $\leq$ reflexiv und transitiv ist. Der Satz von Cantor–Bernstein besagt, daß zwei Mengen, die man ineinander injektiv abbilden kann, gleichmächtig sind. Daraus folgt, daß $\leq$ antisymmetrisch ist, und damit eine partielle Ordnung auf der Klasse der Kardinalzahlen.

Für je zwei Mengen x, y existiert nach Zorns Lemma eine maximale Bijektion f zwischen einer Teilmenge x_0 von x und einer Teilmenge y_0 von y. Wenn beide, x_0 und y_0, echte Teilmengen wären, könnte man f weiter fortsetzen. Also ist f eine Bijektion zwischen x_0 und y oder zwischen x oder y_0. Es folgt, daß $\leq$ eine lineare Ordnung ist.

Definition Eine Wohlordnung von X ist eine lineare Ordnung, für die jede nicht–leere Teilmenge von X ein kleinstes Element enthält. Wenn X keine Menge sondern nur eine Klasse ist, fordert man zusätzlich, daß für alle $x \in X$ die Menge $\{y \mid y < x\}$ der Vorgänger eine Menge ist.

[1] Man könnte $|x|$ als die Klasse aller zu x gleichmächtigen Mengen definieren. Dann wären allerdings Kardinalzahlen keine Mengen.

Lemma 1.1 *Die Klasse aller Kardinalzahlen wird durch $\leq$ wohlgeordnet.*

Beweis:

Nach dem *Wohlordnungssatz* (der aus dem Auswahlaxiom folgt) hat jede Menge eine Wohlordnung. Wie oben sieht man mit Hilfe von Zorns Lemma, daß für je zwei Wohlordnungen die eine isomorph zu einem Anfangsstück[2] der anderen ist, oder umgekehrt. Wenn κ die Mächtigkeit der Wohlordnung x ist, ist daher jede kleinere Kardinalzahl die Mächtigkeit eines Anfangsstücks von x. Daraus folgt die Behauptung, weil die Anfangsstücke einer Wohlordnung selbst durch Inklusion wohlgeordnet sind. □

$\aleph_0$ ist die Mächtigkeit der (wohlgeordneten) Menge der natürlichen Zahlen. Mengen der Mächtigkeit $\aleph_0$ heißen abzählbar. Alle echten Anfangsstücke sind endlich, $\aleph_0$ ist daher die kleinste unendliche Kardinalzahl.

Jede Familie $(\kappa_i)_{i\in I}$ von Kardinalzahlen hat eine obere Schranke(zum Beispiel die Mächtigkeit von $\bigcup_{i\in I} x_i$, wenn $\kappa_i = |x_i|$). Es gibt also auch eine kleinste Schranke $\sup_{i\in I} \kappa_i$.

Summe, Produkt und Potenz von Kardinalzahlen definiert man durch disjunkte Vereinigung, cartesisches Produkt und Mengenpotenz. Also

$$|x| + |y| = |x \cup y| \tag{1}$$

$$|x| \cdot |y| = |x \times y| \tag{2}$$

$$|x|^{|y|} = |{}^y x| \tag{3}$$

Dabei nehmen wir in (1) an, daß x und y disjunkt sind. In (3) ist ${}^y x$ die Menge aller Funktion von y nach x.

Man zeigt leicht, daß die gleichen Regeln wie für das Rechnen mit natürlichen Zahlen gelten. Zum Beispiel ist $\left(\kappa^\lambda\right)^\mu = \kappa^{\lambda\cdot\mu}$. Der folgende Satz wurde von Cantor bewiesen.

Satz 1.2

1. *Wenn κ unendlich ist, ist $\kappa \cdot \kappa = \kappa$*
2. $2^\kappa > \kappa$

Aus 2. folgt, daß es keine größte Kardinalzahl gibt. Weil jede Menge von Kardinalzahlen ein Supremum hat, ist die Klasse der Kardinalzahlen kein Menge.

Folgerung 1.3

1. *Wenn λ unendlich ist, ist $\kappa + \lambda = \max(\kappa, \lambda)$*
2. *Wenn $\kappa > 0$ und λ unendlich ist, ist $\kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda)$*
3. *Wenn κ unendlich ist, ist $\kappa^\kappa = 2^\kappa$*

Beweis:

Sei $\mu = \max(\kappa, \lambda)$. Dann ist $\mu \leq \kappa + \lambda \leq \mu + \mu \leq 2 \cdot \mu \leq \mu \cdot \mu = \mu$ und wenn $\kappa > 0$, ist $\mu \leq \kappa \cdot \lambda \leq \mu \cdot \mu = \mu$.

[2] Ein Anfangsstück einer partiellen Ordnung X enthält mit jedem Element auch alle kleineren Elemente von X.

Schließlich ist

$$2^\kappa \leq \kappa^\kappa \leq (2^\kappa)^\kappa = 2^{\kappa\cdot\kappa} = 2^\kappa.$$

□

Folgerung 1.4 *Die Menge aller endlichen Folgen von Elementen der nicht–leeren Menge x hat die Mächtigkeit* $\max(|x|, \aleph_0)$.

Beweis:

Sei κ die Zahle der endlichen Folgen aus x. Es ist klar, daß $|x| \leq \kappa$ und $\aleph_0 \leq \kappa$. Andererseits ist

$$\kappa = \sum_{n\in\mathbb{N}} |x|^n \leq \left(\sup_{n\in\mathbb{N}} |x|^n\right) \cdot \aleph_0 = \max(|x|, \aleph_0),$$

weil

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} |x|^n = \begin{cases} 1 & \text{wenn } |x| = 1 \\ \aleph_0 & \text{wenn } 2 \leq |x| \leq \aleph_0 \\ |x| & \text{wenn } \aleph_0 \leq |x| \end{cases} .$$

□

Für jede Kardinalzahl κ nennt man die kleinste Kardinalzahl κ^+, die größer als κ, die Nachfolgerkardinalzahl von κ. Aus 1.2.2 folgt $\kappa^+ \leq 2^\kappa$. Die allgemeine Kontinuumshypothese (GCH) besagt, daß für alle unendlichen κ

$$\kappa^+ = 2^\kappa.$$

GCH ist unabhängig von den Axiomen der Mengenlehre[3].

[3] Wenn man die Konsistenz dieser Axiome annimmt.

2 Ordinalzahlen

Die Klasse On der Ordinalzahlen wird bis auf Isomorphie durch Eigenschaften charakterisiert, die auch die Klasse der Kardinalzahlen hat:

a) On ist wohlgeordnet

b) On ist keine Menge

Die Wohlgeordnetheit hat das folgende *Induktionsprinzip* zur Folge:

> *Sei $\mathcal{E}$ eine Eigenschaft von Ordinalzahlen. Nehmen wir an, daß jedes α, für das alle kleineren Ordinalzahlen die Eigenschaft $\mathcal{E}$ haben, selbst die Eigenschaft $\mathcal{E}$ hat. Dann haben alle Ordinalzahlen die Eigenschaft $\mathcal{E}$.*

Sei $(X, <)$ ein Wohlordnung und f ein maximaler Isomorphismus zwischen einem Anfangsstück von X und einem Anfangsstück von On. Man sieht leicht, daß f auf ganz X erklärt sein muß. Wenn X eine echte Klasse ist, ist f ein Isomorphismus zwischen X und On. Wenn X eine Menge ist, ist f ein Isomorphismus zwischen X und einem echten Anfangsstück, das immer die Form

$$\{\beta \mid \beta < \alpha\}$$

hat. Man sieht leicht[4], daß f, und damit α, eindeutig durch X bestimmt ist. Man nennt α den Ordnungstyp von $(X, <)$

$$\alpha = \mathrm{otp}(X, <).$$

Weil viele Bezeichnungen erheblich vereinfacht werden, identifizieren wir jede Ordinalzahl mit der Menge ihrer Vorgänger[5]

$$\alpha = \{\beta \mid \beta < \alpha\}.$$

α ist also sein eigener Ordnungstyp.
Jede Kardinalzahl ist nach dem Wohlordnungssatz Mächtigkeit einer Ordinalzahl. In der axiomatischen Mengenlehre wird eine Kardinalzahl mit der kleinsten Ordinalzahl identifiziert, die diese Mächtigkeit hat. Die Klasse der Kardinalzahlen wird auf diese Weise eine Teilklasse von On: κ ist genau dann eine Kardinalzahl, wenn alle $\alpha < \kappa$ eine kleinere Mächtigkeit als κ haben.

Satz 2.1 *Sei G eine Zuordnungsvorschrift, die jeder auf einer Ordinalzahl definierten Funktion f eine Menge $G(f)$ zuordnet. Dann gibt es genau eine auf der Klasse* On *definierte Funktion F, die für alle α die Rekursionsgleichung*

$$F(\alpha) = G(F \restriction \alpha)$$

erfüllt.

[4] Wenn $g : X \to$ On ein zweiter Isomorphismus auf ein Anfangsstück ist, betrachte das kleinste x mit $f(x) \neq g(x)$.

[5] In der axiomatischen Mengenlehre werden Ordinalzahlen tatsächlich so eingeführt.

Beweis:

Man beweist leicht durch Induktion, daß es für alle β eine eindeutig bestimmte Funktion F_β gibt, die auf β definiert ist und für alle $\alpha < \beta$ die Rekursionsgleichung erfüllt. Wir setzen $F = \bigcup_{\beta \in \mathrm{On}} F_\beta$. □

BEISPIEL:

Die Alephfunktion indiziert die unendlichen Kardinalzahlen durch Ordinalzahlen. Man setzt

$$\aleph_\alpha = \text{Die kleinste unendliche Kardinalzahl, die größer als alle } \aleph_\beta \ (\beta < \alpha) \text{ ist.}$$

Die kleinste Ordinalzahl ist $0 = \emptyset$, die nächstgrößere ist $1 = \{0\}$, dann $2 = \{0, 1\}$ und so weiter. Wir erhalten so die natürlichen Zahlen. Der Ordnungstyp der natürlichen Zahlen ist $\omega = \{0, 1, \ldots\}$, die nächste Ordinalzahl ist $\omega + 1 = \{0, 1, \ldots, \omega\}$, et cetera.
Die natürlichen Zahlen und $\omega = \aleph_0$ sind Kardinalzahlen.

Allgemein nennen wir eine Ordinalzahl β, die einen unmittelbaren Vorgänger α hat, eine Nachfolgerzahl und schreiben $\beta = \alpha$. Für natürliche Zahlen n ist

$$\alpha + n = \alpha + \underbrace{1 + \ldots + 1}_{n- \text{ mal}}.$$

Ordinalzahlen > 0, die keine Nachfolgerzahlen sind, heißen Limeszahlen. Wenn die Menge $\{\alpha_i \mid i \in I\}$ nicht–leer ist und kein größtes Element hat, ist $\sup_{i \in I} \alpha_i$ eine Limeszahl. Jede Ordinalzahl scheibt sich eindeutig in der Form

$$\lambda + n,$$

wobei $\lambda = 0$ oder eine Limeszahl ist.

Eine endliche Folge der Länge n mit Elementen aus A ist eine Funktion $s : n \to A$.

$$^{<\omega}A = \bigcup_{n < \omega} {}^nA$$

bezeichnet die Menge alle endlichen Folgen von Elementen aus A.

Anhang B

Körpertheorie

3 Ringe und Körper

3.1 Homomorphiesatz

Sei R ein kommutativer Ring. Ein *Ideal* $I \lhd R$ ist eine additive Untergruppe von R, die unter Multiplikation mit beliebigen Elementen von R abgeschlossen ist. R ist genau dann ein Körper, wenn das Nullideal das einzige *echte* Ideal[1] ist.
Die Nebenklassen $a+I$ bilden mit den Operationen (a+I)+(b+I)=(a+b)+I und $(a+I)(b+I) = ab+I$ den *Faktorring* R/I. Wenn $f : R \to S$ ein Homomorphismus ist, ist der Kern

$$\ker f = \{r \in R \mid f(r) = 0\}$$

ein Ideal. Man faktorisiert f eindeutig als

$$R \to R/I \to S.$$

Der erste Pfeil ist der *natürliche* Homomorphismus, der zweite eine isomorphe Einbettung (Homomorphiesatz).

Sei R ein kommutativer Ring und a Element eines Oberrings. Dann können wir die von a erzeugte Ringerweiterung schreiben als

$$R[a] = \left\{p(a) \;\middle|\; p(X) \in R[X]\right\}$$

oder, wenn $I \lhd R[X]$ der Kern des Einsetzungshomomorphismus $p(X) \mapsto p(a)$ ist, als

$$R[a] = R[X]/I.$$

Die hier auftretenden I sind genau die Ideale von $R[X]$, die R in 0 schneiden.

[1] d.h. $R \neq I$

3.2 Primideale

Ein Integritätsbereich ist ein nicht–trivialer kommutativer Ring, der keine Nullteiler hat. Das heißt, daß $R \neq 0$ und

$$a, b \neq 0 \;\Rightarrow\; ab \neq 0.$$

Sei I ein Ideal in R. Der Faktorring R/I ist genau dann ein Integritätsbereich, wenn P ein *Primideal* ist, das heißt, daß $R \neq P$ und

$$a, b \in R \setminus I \;\Rightarrow\; ab \in R \setminus I.$$

Jedes echte Ideal läßt sich mit Zorns Lemma zu einem *maximalen* Ideal M (gemeint ist ein maximales echtes Ideal) erweitern. M ist genau dann maximal, wenn R/M ein Körper ist.
Der Ring der ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ und Polynomringe $K[X]$ über Körpern K sind *Hauptidealringe*. Das sind Integritätsbereiche, in denen jedes Ideal I von einem Element a erzeugt wird: $I = Ra$. In Hauptidealringen ist ein $I = Ra \neq 0$ genau dann prim, wenn I maximal ist, und genau dann, wenn a irreduzibel[2] ist.

3.3 Quotientenkörper

Unterringe von Körpern sind immer Integritätsbereiche. Umgekehrt läßt sich jeder Integritätsbereich R in einen kleinsten Körper Q einbetten, den *Quotientenkörper* von R. Es ist

$$Q = \{\frac{a}{b} \mid a \in R,\ b \in R,\ b \neq 0\}$$

Lemma 3.1 *Sei K ein Oberkörper von R. Dann ist der von R in K erzeugte Körper (über R) isomorph zu Q.* □

Der Quotientenkörper von $\mathbb{Z}$ ist der Körper $\mathbb{Q}$ der rationalen Zahlen. Der Quotientenkörper eines Polynomrings $K[X]$ über einem Körper K ist $K(X)$, der rationale Funktionenkörper über K.

3.4 Charakteristik

Jeder Körper K enthält einen kleinsten Unterring:

$$R = \{z \cdot 1 \mid z \in \mathbb{Z}\}$$

R ist isomorph zu einem Faktorring von $\mathbb{Z}$. Es gibt zwei Fälle:

1. $R = \mathbb{Z}$. Dann hat K die *Charakteristik* 0.

[2] Elemente mit multiplikativen Inversen heißen *Einheiten*. $a \neq 0$ heißt irreduzibel, wenn aus $a = bc$ folgt, daß entweder b oder c eine Einheit ist.

2. Für eine Primzahl p ist $R = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$, der Körper mit p Elementen. p ist die Charakteristik von K[3].

Im Fall der Charakteristik p ist $\mathbb{F}_p$ der kleinste Unterkörper von K, der *Primkörper*. Wenn die Charakteristik 0 ist, ist der Primkörper $\mathbb{Q}$.

[3] Man spricht hier auch von *positiver* oder *endlicher* Charakteristik

4 Algebraisch abgeschlossene Körper

Sei $K \subset L$ eine Körpererweiterung und a ein Element von L. $K(a)$, der von a über K erzeugten Unterkörper von L, ist der Quotientenkörper von $K[a]$. Es ist

$$K[a] = K[X]/P$$

für ein Primideal $P \lhd K[X]$. Für P gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Wenn $P = 0$, heißt a *transzendent* über K. $K[a]$ ist dann isomorph zum Polynomring $K[X]$ und $K(a)$ isomorph zum rationalen Funktionenkörper.
2. Sonst wird P von einem irreduziblen Polynom $p(x)$, dem *Minimalpolynom* erzeugt. a heißt *algebraisch* über K. Weil P maximal ist, ist jetzt $K(a) = K[X]$.

Eine Körpererweiterung$K \subset L$ heißt algebraisch, wenn alle Elemente von L algebraisch über K sind.

Lemma 4.1

1. *Die Erweiterung $K \subset K(a)$ ist genau dann algebraisch, wenn a algebraisch über K ist.*
2. *Wenn $H \subset K$ und $K \subset L$ algebraische Körpererweiterungen sind, ist L algebraische Erweiterung von H*

□

Definition Ein Körper K heißt algebraisch abgeschlossen, wenn jedes nicht–konstante Polynom mit Koeffizienten aus K eine Nullstelle in K hat.

Lemma 4.2
K sei ein Körper. Es sind äquivalent:

a) K ist algebraisch abgeschlossen.

b) K hat keine echte algebraische Körpererweiterung.

c) Jedes Polynom aus $K[X]$ zerfällt in ein Produkt von linearen Polynomen.

□

Definition Eine algebraische Erweiterung L von K, die algebraisch abgeschlossen ist, heißt algebraischer Abschluß von K.

Satz 4.3 *Jeder Körper K hat einen bis auf Isomorphie über K eindeutig bestimmten algebraischen Abschluß.* □

Wir bezeichnen mit

$$\mathrm{acl}(K)$$

den algebraischen Abschluß von K.

Sei M eine Erweiterung von K. Nach 4.1.1) ist die Menge L aller Elemente von M, die algebraisch über K sind ein algebraische Körpererweiterung von K. Man nennt L den relativen algebraischen Abschluß von K in M. Wenn M algebraisch abgeschlossen ist, ist nach 4.1.2) auch L algebraisch abgeschlossen und daher ein algebraischer Abschluß von K.

Lemma 4.4 *Algebraisch abgeschlossene Körper sind unendlich.*

Beweis:

Wenn K endlich ist, ist

$$\prod_{a \in K} (X - a) + 1$$

ein Polynom ohne Nullstelle in K. □

5 Reell abgeschlossene Körper

Sei R ein Integritätsbereich. Eine lineare $<$ Ordnung auf R ist verträglich mit der Ringstruktur, wenn für alle $x, y, z \in R$

$$\begin{aligned} x < y &\rightarrow y + z < x + z \\ x < y \wedge 0 < z &\rightarrow yz < yz \end{aligned}$$

Ein Körper $(K, <)$ zusammen mit einer verträglichen Anordnung ist ein *angeordneter Körper*.

Lemma 5.1 *Sei R ein Integritätsbereich und $<$ eine verträgliche Anordnung von R. Dann setzt sich $<$ eindeutig zu einer Anordnung des Quotientenkörpers fort.*

Beweis:

Definiere

$$\frac{a}{b} > 0 \Leftrightarrow ab > 0.$$

□

Man zeigt leicht, daß in einem angeordneten Körper Quadratsummen niemals negativ sein können. Insbesondere sind alle $1, 2, \ldots$ positiv. Die Charakteristik angeordneter Körper ist also 0.

Ein Körper K, in dem -1 keine Quadratsumme ist, heißt formal reell. Körper mit einer Anordnung sind formal reell.

Lemma 5.2 *Formal reelle Körper haben eine Anordnung.*

Beweis:

Wir stellen zuerst fest, daß $\Sigma\Box$, die Menge aller Quadratsummen in K, ein Semipositivbereich ist. Ein Semipositivbereich ist eine Menge P mit

$$\begin{aligned} &(1) && \Sigma\Box &\subset P \\ &(2) && P + P &\subset P \\ &(3) && P \cdot P &\subset P \\ &(4) && -1 &\notin P \end{aligned}$$

Man überlegt leicht, daß die ersten drei Bedingungen implizieren, daß $x \in P \Rightarrow \frac{1}{x} \in P$. Die Bedingung (4) ist deshalb gleichbedeutend $P \cap (-P) = 0$. Man sieht auch leicht, daß für alle b die Menge $P + b \cdot \Sigma\Box$ wieder alle Eigenschaften eines Semipositivbereich hat, bis vielleicht auf (4). Und daß (4) genau dann gilt, wenn $-b \notin P$.

Jetzt wählen wir für P einen maximalen Semipositivbereich. Dann gilt $P \cup (-P) = K$. Wir setzen

$$x \leq y \Leftrightarrow y - x \in P$$

und erhalten eine verträgliche Anordnung von K. □

Folgerung 5.3 (aus dem Beweis) *Sei a ein Element von K. Es gibt genau dann ein Anordnung von K, bezüglich der a negativ wird, wenn a keine Summe von Quadraten ist.*

Beweis:
Wenn $a \notin \Sigma\Box$, ist $\Sigma\Box - a \cdot \Sigma\Box$ ein Semipositivbereich. □

Definition Ein angeordneter Körper heißt reell abgeschlossen, wenn

a) jedes positive Element Quadrat ist,

b) jedes Polynom von ungeradem Grad eine Nullstelle hat.

Der Körper der reellen Zahlen ist reell abgeschlossen. Ebenso der Körper der reellen algebraischen Zahlen. Allgemein ist jeder Körper der relativ abgeschlossen in einem reell abgeschlossenen Körper ist, selbst reell abgeschlossen.

Mit Hilfe der Methoden des Beweises von Lemma 5.2 sieht man relativ leicht, daß man jeden angeordneten Körper $(K, <)$ zu einem reell abgeschlossenen Körper

$$(K, <) \subset (L, <)$$

erweitern kann, der algebraisch über K ist. Man nennt $(L, <)$ einen *reellen Abschluß* von $(K, <)$. Der folgende Satz ist weniger leicht:

Satz 5.4 *Jeder angeordnete Körper $(K, <)$ hat einen bis auf Isomorphie über K eindeutig bestimmten reellen Abschluß.* □

Der Hauptsatz der Algebra gilt für beliebige reell abgeschlossene Körper[4]:

Satz 5.5 *Sei K reell abgeschlossen. Dann ist $K(\sqrt{-1})$ algebraisch abgeschlossen.*

Folgerung 5.6 *In einem reell abgeschlossenen Körper K gibt es nur zwei Arten von (normierten) irreduziblen Polynomen:*

- *Lineare Polynome*
$$X - a,$$
$(a \in K)$

- *Quadratische Polynome*
$$(X - b)^2 + c,$$
$(b, c \in K,\ c > 0)$

[4] Weil in reell abgeschlossenen Körpern $(K, <)$ die nicht–negativen Elemente gerade die Quadrate sind, wird die Anordnung $<$ eindeutig durch die Körperstruktur bestimmt. Es macht also Sinn zu sagen, daß K reell abgeschlossen ist.

Literaturverzeichnis

[1] Wilfried Hodges. *Model Theory.* Encyclopedia of Mathematics and its Applications. Cambridge University Press, 1993.

[2] Wilfried Hodges. *A Shorter Model Theory.* Cambridge University Press, 1997.

[3] Serge Lang. *Algebra.* Addison–Wesley Publishing Company, second edition, 1984.

[4] Bruno Poizat. *Cours de Théorie des Modèles.* Nur Al-Mantiq Wal-Ma'rifah, Villeurbanne, 1985.

Index

0, 81
1, 81
2, 81
$\forall$, 10
$(\mathfrak{A}, R)$, 7
$(\mathfrak{A}, a_1, \ldots, a_n)$, 7
$\mathfrak{A} \Rightarrow_\Delta \mathfrak{B}$, 30
$\mathfrak{A} \Rightarrow_\exists \mathfrak{B}$, 30
$\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}$, 4
$\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$, 18
$\mathfrak{A} \models \phi[\vec{b}]$, 10
$\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$, 19
$\mathfrak{A} \restriction K$, 6
$\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, 5
$\mathfrak{A}_B$, 7
$\forall\exists$–Formel, 31
A–definierbare Menge, 68
$[A]^n$, 56
$\mathfrak{B} \restriction A$, 5
$\mathrm{Ded}(T)$, 17
$\mathrm{Diag}(\mathfrak{A})$, 14
$\exists\forall$–Formel, 32
$\exists$, 10
$\exists^\infty$, 74
$\mathbb{F}_p$, 84
$I \lhd R$, 82
$K(X)$, 83
$K[X]$, 83
$K(a)$, 85
$\mathrm{L_{AG}}$, 3
$\mathrm{L_{AR}}$, 3
$L(B)$, 7
$L(C)$, 7
$\mathrm{L_G}$, 3
$\mathrm{L_{M(R)}}$, 38
$\mathrm{L_{Me}}$, 3
$\mathrm{L_N}$, 3
$\mathrm{L_\emptyset}$, 3
$\mathrm{L_O}$, 3
$\mathrm{L_R}$, 3
L_{Sk}, 58
$\mathrm{Mod}(T)$, 17
On, 80
$\mathbb{Q}$, 83
R/I, 82
$R[a]$, 82
$\langle S \rangle^{\mathfrak{B}}$, 5
$\langle \emptyset \rangle^{\mathfrak{B}}$, 5
$\mathrm{S}(B)$, 25
$\mathrm{S}_1^{\mathfrak{A}}(B)$, 25
$\mathrm{S}_n(B)$, 25
$\mathrm{S}_n^{\mathfrak{A}}(B)$, 25
$\mathrm{S}_n(T)$, 44
$T \equiv S$, 17
$T \vdash S$, 17
$T \vdash \phi$, 17
$T_{\forall\exists}$, 33
$T_\forall$, 31
$\mathrm{Th}(\mathcal{K})$, 17
$\mathrm{T_{AAK}}$, 38
$\mathrm{T_{AG}}$, 16
$\mathrm{T_{AAK_0}}$, 39
$\mathrm{T_{AAK_p}}$, 39
$\mathrm{T_{DLO}}$, 37
$\mathrm{T_K}$, 16
$\mathrm{T_{M(R)}}$, 38
$\mathrm{T_R}$, 16
$\mathrm{T_{RAK}}$, 40
$\mathrm{T_{Sk}}(L)$, 58
T_∞, 37
$\mathbb{Z}$, 83
$\aleph_0$–saturiert, 46
$\mathrm{acl}(K)$, 86
$\mathrm{acl}(A)$, 68
$\aleph_0$, 78
$\aleph_\alpha$, 81
$\alpha + 1$, 81
$\alpha + n$, 81
$\vec{b}\frac{a}{x_S}$, 11
cl^S, 71
cl_S, 72

$\dim(\mathfrak{M})$, 72
$\dim_S(X)$, 72
$\dim(X)$, 72
$\leftrightarrow$, 10
$\langle\phi(\overline{x})\rangle$, 44
$\phi(\pi)$, 12
$\phi(t_1,\ldots,t_n)$, 12
$\phi(x_1,\ldots,x_n)$, 11
$f:\mathfrak{A}\to_\Delta\mathfrak{B}$, 30
$\langle\phi(\overline{x})\rangle_A$, 60
$\phi(\mathfrak{M})$, 63
$f(p)$, 47
$\doteq$, 10
$h:\mathfrak{A}\xrightarrow{\prec}\mathfrak{B}$, 19
$h:\mathfrak{A}\xrightarrow{\sim}\mathfrak{B}$, 4
$h:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$, 4
$\to$, 10
κ–kategorische Theorie, 27, 28
$\kappa\leq\lambda$, 77
κ^+, 79
κ–saturiert, 67
κ–stabil, 66
$\mathrm{mult}(p)$, 68
$\neg$, 10
$\bigvee_{i<m}$, 13
$\vee$, 10
$\mathrm{otp}(X,<)$, 80
ω, 81
$^{<\omega}A$, 81
ω–homogen, 63
    algebraisch, 49
ω–stabil, 59
$\sup_{i\in I}\alpha_i$, 81
$\sup_{i\in I}\kappa_i$, 78
$\perp$, 13
$\top$, 13
$\mathrm{tp}(a/B)$, 25
$\mathrm{tp}^{\mathfrak{A}}(a/B)$, 25
$t(t_1,\ldots,t_n)$, 9
$t(x_1,\ldots,x_n)$, 8
$t^{\mathfrak{A}}[\vec{b}]$, 8
$t^{\mathfrak{A}}[a_1,\ldots,a_n]$, 8
$\mathrm{tp}(\overline{a})$, 53
$\mathrm{tp}_{\mathrm{qf}}(\overline{a})$, 50
$\bigcup_{i\in I}\mathfrak{A}_i$, 6
$\bigwedge_{i<m}$, 13
$\wedge$, 10
$v_0, v_1, \ldots$, 8
^yx, 78

17. Hilbertsches Problem, 41

Abbildung
    elementare, 19, 47
abelsche Gruppe, 16
Abschlußoperator, 69
abzählbare
    Menge, 78
    Theorie, 43
äquivalente
    Formeln, 13
    Theorien, 17
Äquivalenz, 10
algebraisch
    ω–homogen, 49
    abgeschlossener Körper, 38, 85
algebraische
    Formel, 68
    Körpererweiterung, 85
algebraischer
    Abschluß, 68, 85
    Typ, 68
algebraisches
    Element, 68
    Körperelement, 85
Allformel, 14
allgemeingültige Aussage, 17
Allquantor, 10
Amalgamationseigenschaft, 51
Anfangsstück, 78
angeordneter Körper, 87
atomare Formel, 45, 60
atomarer Typ, 45, 60
atomares
    Diagramm, 14
    Modell, 53
    Tupel, 53, 60
Auslassen einer Formelmenge, 24
    lokales, 43
Aussage, 12
Austauscheigenschaft, 69

basic Formel, 12
Basis, 71, 72
Baum, 55
Belegung, 8
binärer Baum, 55
Bindungsstärke, 10

Charakteristik, 83

deduktiver Abschluß, 17
definitorische
  Äquivalenz, 49
  Erweiterung, 49
Diagramm
  atomares, 14
  elementares, 19
Dichtheit, 54
Dimension, 72
Disjunktion, 10
disjunktive Normalform, 13

echtes Ideal, 82
Einbettung, 4
  elementare, 19
Eindeutige Lesbarkeit, 8, 11
einfache Existenzformel, 34
Einheit, 83
Einsetzungshomomorphismus, 82
elementare
  Unterstruktur, 19
  Abbildung, 19, 47
  Einbettung, 19
  Erweiterung, 19
  gerichtete Familie, 20
  Klasse, 17
elementares Diagramm, 19
endlich erfüllbare
  Formelmenge, 24
  Theorie, 22
Erfüllen, 11
Erfüllungsmenge, 63
Erhaltungssätze, 29
Erweiterung
  atomare, 59
  prime, 59
Erzeugendensystem, 71
Erzeugnis, 5
erzeugter Haupttyp, 44, 60
Existenzformel, 14
  einfache, 34
  primitive, 34
existenzielle Formel, 14
Existenzquantor, 10
Expansion, 6

Faktorring, 82
Folgerung, 17
formal reeller Körper, 87
Formel
  ∀∃, 31
  ∃∀, 32
  algebraische, 68
  All–, 14
  atomare, 10, 45, 60
  basic, 12
  Existenz–, 14
  existenzielle, 14
  konsistente, 43
  minimale, 74
  quantorenfreie, 12
  streng minimale, 74
  universelle, 14
  vollständige, 45, 60
freies Vorkommen, 11
Funktionszeichen, 3

GCH, 79
gerichtete
  Familie, 6
    elementare, 20
  partielle Ordnung, 6
Gleichheitszeichen, 10
gleichmächtige Mengen, 77
Grad eines Typs, 68
Graph, 52
Grundmenge, 4
Gültigkeit, 12

Hauptidealring, 83
Hauptsatz der Algebra, 88
Haupttyp, 44, 60
Henkin–Konstante, 22
Henkin–Theorie, 22
Hilberts 17. Problem, 41
Hilbertscher Nullstellensatz, 40
Homomorphiesatz, 82
Homomorphismus, 4

Ideal, 82
  echtes, 82
  maximales, 83
  Null–, 82
  primes, 83
Implikation, 10
Indiscernibles, 56
Induktion, 80
induktive Theorie, 32
Integritätsbereich, 83
irreduzibles Ringelement, 83

Isolieren, 44
isolierter Typ, 45, 60
isomorphe Strukturen, 4
Isomorphismus, 4

Junktoren, 10

Kardinalität, 4
Kardinalzahl, 77, 80
Kardinalzahlarithmetik, 78
Kategorizität, 27
Kette, 6
    elementare, 20
    stetige, 25
Kettenlemma, 20
Klammern, 10
Körper, 16
    algebraisch abgeschlossener, 38, 85
    angeordneter, 87
    formal reeller, 87
    reell abgeschlossener, 88
Körpererweiterung
    algebraische, 85
kommutativer Ring, 16
Kompaktheitssatz, 22
Konjunktion, 10
konjunktive Normalform, 13
konsistente
    Formel, 43
    Formelmenge, 43
    Theorie, 16
Konstante, 3
konstanter Term, 9
konstruktible Menge, 60
Kontinuumshypothese, 79

Limeszahl, 81
logische Zeichen, 10

Mächtigkeit, 4, 77
Matroid, 69
maximales Ideal, 83
minimale Formel, 74
Minimalpolynom, 85
Modell, 12, 16
    atomares, 53
    aus Konstanten, 23
    primes, *siehe* Primmodell
    saturiertes, 66
Modellklasse, 17
modellvollständige Theorie, 36
Modul, 38
Morleyisierung, 49
Multiplizität, 68

Nachfolgerkardinalzahl, 79
Nachfolgerzahl, 81
Negationsnormalform, 14
Negationszeichen, 10
Normalform
    disjunktive, 13
    konjunktive, 13
    pränexe, 13
Nullideal, 82
Nullstellensatz, 40

Oberstruktur, 6
Omitting Types, 43
Ordinalzahl, 80
Ordnung, 37
Ordnungstyp, 80

Prädikat, 3
pränexe Normalform, 13
Primerweiterung, 59
Primformel, 10
Primideal, 83
primitive Existenzformel, 34
Primkörper, 84
Primmodell, 53
Primstruktur, 40

Quantorenelimination, 34
quantorenfreie Formel, 12
Quotientenkörper, 83

Randomgraph, 52
rationaler Funktionenkörper, 83
Realisieren einer Formelmenge, 24
    lokales, 43
reell abgeschlossener Körper, 88
reeller Abschluß, 88
Rekursionssatz, 80
relationale Sprache, 49
Relationszeichen, 3
relativer algebraischer Abschluß, 86
Restriktion, 6
Robinsons Test, 36

saturiertes Modell, 66

Saturiertheit, 46
Satz
    von Cantor, 48, 78
    von Cantor–Bernstein, 77
    von Lachlan, 61
    von Löwenheim–Skolem, 27
    von Morley, 76
      abwärts, 67
    von Ramsey, 56
    von Ryll–Nardzewski, 46
    von Vaught, 48
    Zwei-Kardinalzahlsatz von Vaught, 64
schmale Theorie, 48
Skelett, 50
Skolemfunktion, 58
Skolemtheorie, 58
Sprache, 3
stabil
    κ–stabil, 66
    ω–stabil, 59
stetige Kette, 25
streng minimale
    Formel, 74
    Theorie, 70
Struktur, 3
Substitution, 9
Substitutionslemma, 9, 12

Tarskis
    Kettenlemma, 20
    Test, 19
Teilsprache, 6
Term, 8
    konstanter, 9
Theorie, 16
    κ–stabile, 66
    ω–stabile, 59
    abzählbare, 43
    äquivalente, 17
    deduktiv abgeschlossene, 17
    der abelschen Gruppen, 16
    der Körper, 16
    der kommutativen Ringe, 16
    einer Klasse von Strukturen, 17
    endlich erfüllbare, 22
    induktive, 32
    κ–kategorische, 27, 28
    konsistente, 16
    mit Vaughtschem Paar, 65
    modellvollständige, 36
    schmale, 48
    streng minimale, 70
    total transzendente, 59
    universelle, 31
    vollständige, 17
    widerspruchsfreie, 16
total transzendente Theorie, 59
transzendentes Körperelement, 85
trennende Aussage, 29
Trennungslemma, 29
Tupel
    atomares, 53, 60
Typ, 25, 44
    algebraischer, 68
    atomarer, 45, 60
    eines Elements, 25
    erzeugter, 44, 60
    Haupt–, 44
    isolierter, 45, 60
    quantorenfreier, 50

unabhängige
    Aussage, 18
    Menge, 71
universelle
    Formel, 14
    Theorie, 31
Universum, 4
Unterstruktur, 5
    elementare, 19

Variable, 8
Vaughts Test, 27
Vaughtscher Zwei-Kardinalzahlsatz, 64
Vaughtsches Paar, 63
Vaugthsches Paar, 65
Vektorraum, 38
vollständige
    Formel, 45, 60
    Theorie, 17

widerspruchsfreie Theorie, 16
Wohlordnung, 77
Wohlordnungssatz, 78

Zutreffen, 11

Anhang C

Changes

Version 6.0 (28.2.1998)

Erste vollständige Version.

Version 6.1 (7.2.2000)

Anhand einer Liste von Immanuel Hermann wurden viele Druckfehler verbessert.